

Aus der I. medizinischen Klinik des Städt. Krankenhauses
Nürnberg. Vorstand: Professor Dr. Konrad Bingold.

Bakterienbefunde im Blute bei Thrombophlebitis im Pfortadergebiet.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde
einer Hohen Medizinischen Fakultät
der Friedrich-Alexanders-Universität zu Erlangen

vorgelegt von

Edeltraut Meder

aus Nürnberg.

Tag der mündlichen Prüfung: 5. März 1937.

Buchdruckerei Robert Windsheimer, Erlangen-Bruck.

1937

Referent: Geheimrat Professor Dr. Jamin.
Dekan: Professor Dr. Fr. Jamin.



IN DANKBARKEIT
meinen lieben Eltern

Die infektiöse Pfortaderentzündung gilt im allgemeinen als seltene Erkrankung. Und doch wird nicht gar so selten eine Thrombophlebitis im Pfortadergebiet auf dem Obduktionsstisch gefunden, die in vivo nicht diagnostiziert wurde. Im allgemeinen wird in diesen Fällen die Diagnose „septischer Blinddarm“ oder „septisches Darmgeschwür“ gestellt, selten findet sich auf der betreffenden alten Krankengeschichte die klare Diagnose „Pylephlebitis septica“.

Man kann daraus ableiten, daß die Pylephlebitis in vielen Fällen nicht als Haupterkrankung angesehen wird, sondern daß man sie mehr als Begleiterscheinung einer lokalen infektiösen Darmerkrankung auffaßt.

Wie wichtig es aber ist, eine exakte Diagnose auf Pfortaderentzündung zu stellen, ergibt sich daraus, daß die Diagnose allein die Indikation zu einer unter Umständen lebensrettenden Therapie geben kann bei einer Erkrankung, deren Prognose andernfalls fast immer als infaust bezeichnet werden muß.

Aufgabe der vorliegenden Arbeit soll es sein, einen Bericht über die bakteriologische Ätiologie und den klinischen Verlauf von einwandfreien Pylephlebitisfällen zu geben, die in den letzten acht Jahren an unserer Klinik beobachtet werden konnten. Zum Vergleich und Ergänzung dieser Befunde soll die einschlägige Literatur mit herangezogen werden.

Die pathologisch-anatomische Grundlage der Pylephlebitis septica bildet — wie bereits der Name sagt — stets eine Thrombo- oder Endophlebitis im Pfortadergebiet.

Die Entstehung einer Thrombose

und ihr Fortschreiten wird bei dieser Erkrankung häufig durch direktes Übergreifen eines Krankheitsprozesses auf das entsprechende Venengebiet bestimmt. Darüber hinaus kam es aber auch — wie zahlreiche von Dietrich durchgeführte Versuche und Untersuchungen menschlicher Thromben ergeben haben —

zu einer fortschreitenden Thrombose kommen, wenn eine Aenderung in den Beziehungen zwischen Blut und Gefäßwand eintritt.

Eine Schädigung der Gefäßwand allein (z. B. bei Intimaverletzungen oder bei schwerer Erkrankung der Wandschichten) mit Bildung von Rauigkeiten und Verlust des gerinnungshemmenden Endothels führt — auch wenn gleichzeitig Kreislaufstörungen hinzutreten — lediglich zu örtlichen Pfropfbildungen, genügt aber nicht zur Entstehung fortschreitender Thromosen. Ebenso ist auf der anderen Seite eine Veränderung des Blutes oder mechanische Verhältnisse der Blutströmung nur in den seltensten Fällen als alleinige oder überwiegende Ursache für das Entstehen einer Thrombose anzusehen.

Eine Störung im gegenseitigen Verhältnis zwischen Blut und Gefäßwand kann nach Dietrich durch eine gesteigerte Resorptionsleistung gegenüber Krankheitskeimen oder erhöhtem Eiweißabbau ausgelöst werden. Denn die Aufgabe der Keimverarbeitung kommt nicht nur dem R.E.S., sondern auch anderen Gebieten der Strombahn zu. Zu diesen resorptionsbereiten Stellen gehören u. a. Venenklappen, Herzklappen, Gelenkkapseln.

Erneute resorptive Anforderungen der gleichen oder anderer Art führen dann zu einer allgemeinen Sensibilisierung des Gefäßendothels und damit zu Niederschlagsbildungen oder zelligen Reaktionen an der Gefäßinnenhaut.

Wie bereits erwähnt, hat die Schädigung der Gefäßinnenhaut den Verlust der gerinnungshemmenden Eigenschaft des Endothels zur Folge; es kommt zur Bildung einer gallertigen Fibrinmembran, die sich durch Berührung mit den blutfremden Stoffen der Verletzungsstelle aus dem Blutplasma abscheidet und die geschädigte Stelle überzieht. Auf diesem gallertigen Häutchen bleiben zunächst einige Blutplättchen haften. Diese Vorgänge stellen die erste Anlage eines Thrombus dar. Die weitere Anlagerung von Thrombozyten und Blutkörperchen, sowie die Formgestaltung hängt von den hämodynamischen Verhältnissen ab.

Die resorptionsbereiten Orte der Strombahn werden somit zum Krankheitsherd, wobei die Erkrankung von dem Grade der Sensibilisierung abhängig ist.

Unter den

Ursachen der Thrombose

steht nach der Auffassung und den Untersuchungsergebnissen zahlreicher Autoren wie Baumgarten, Cornil, Widal, Lubarsch, Dietrich u. a. die Infektion mit an erster Stelle.

Dabei wirkt die Infektion weder ausschließlich auf das Blut ein etwa durch Zerstörung der Blutkörperchen oder Veränderung der Blutbeschaffenheit, noch auf die Gefäßwand durch unmittelbare Keiman siedlung. Sondern auch hier sind es die unter dem Einfluß der Infektion eintretenden Veränderungen in der Beziehung zwischen Blut und Gefäßwand, die ein Haften der Krankheitserreger an reaktionsbereiter Stelle unter geeigneten Verhältnissen bewirken.

Die Rolle infektiöser Prozesse ist bei der Entstehung von Thrombosen sehr verschieden. Zunächst können Keime am Ort ihrer Ansiedlung (Primärherd) zu einer örtlichen oder fortschreitenden Thrombose führen. Weiterhin können Keime in das Quellgebiet einer Vene verschleppt werden, an reaktionsbereiten Stellen haften bleiben und zur Bildung eines Thrombus führen. Die Reaktionsbereitschaft kann aber auch über den ganzen Körper ausgebreitet sein. Sie wird dann an irgendeiner Stelle entfernt von einem Krankheitsort, bei Stromverlangsamung Anlagerung kleiner Abscheidungen und davon ausgehende fortschreitende Thrombosen bewirken. So entstehen nach Dietrich die Fernthrombosen, das heißt zwischen Wurzelgebiet und Thrombus liegt eine freie Gefäßstrecke.

Art, Größe und Schicksal des Thrombus hängt nach der Auffassung Dietrichs von dem Verhältnis der Bakterien gegenüber der Endothelreaktion ab. Reaktionserfolg im abgestimmten Organismus führt zur Keimvernichtung, Abschluß und Organisation des Thrombus, also zur Heilung. Ein Überwiegen der Keime aber führt zur Vermehrung am Ort der Haftung und zu stärkeren entzündlichen Reaktionen der Wand. So entsteht das Bild der

infektiösen Thrombophlebitis.

Hierbei ist es möglich, daß die Infektion von außen an die Gefäßwand herantritt und sie durchdringt (auf dem Wege der Vasa vasorum oder kleiner Venen der Umgebung). An der Intima kommt es dann zu einer Endothelnekrose und im Anschluß an diese zu einer Thrombophlebitis. So entsteht zum Beispiel die infektiöse Sinusthrombose nach Otitis media. Oder aber es können im Blute kreisende Keime an bereiter Stelle haften bleiben und Oberhand gewinnen. Dieser Vorgang geht meist mit stärkeren Erscheinungen und Schädigungen einher, die in Leukozytendurchsetzung der Wand und Einwanderung

in den Thrombus bestehen. Im Anschluß daran kann es letzten Endes zu rein eitriger Einschmelzung einer Gefäßstrecke kommen. Bei der infektiösen Thrombophlebitis handelt es sich nach Dietrich um über größere Gefäßstrecken ausgedehnte Leukozyteninfiltrate.

Daneben besteht natürlich auch die Möglichkeit, daß ein bereits vorhandener Thrombus z. B. von einer fortschreitenden Eiterung eines Wundgebietes erreicht und so von außen her infiziert wird; dieser Vorgang geht natürlich einher mit einer gleichzeitigen Zerstörung der Gefäßwand und des Thrombus.

Es kann auch vom Blut aus die sekundäre Infektion eines bereits bestehenden Thrombus erfolgen. Hauptsächlich wird eine sekundäre Wandinfektion erst durch einen infizierten Embolus bewirkt, der in einem Gefäß stecken bleibt.

Doch — wie bereits näher ausgeführt wurde — besteht nach allen Ergebnissen der experimentellen Forschung kein Zweifel, daß ein Thrombus mit entzündlicher Wandveränderung, das heißt eine Thrombophlebitis hauptsächlich durch primäre infektiöse Einflüsse zustande kommt.

Die infektiöse Thrombophlebitis stellt nun einen Herd dar, von dem aus durch die Kommunikation mit der Blutbahn dauernd oder intermittierend Bakteriämien auftreten, es entsteht also klinisch das Bild einer Sepsis. Denn damit sind die für das Zustandekommen und für das Wesen einer Sepsis erforderlichen zwei Faktoren gegeben: Sepsisherd und Bakteriämie.

Nach der Schottmüller'schen Sepsisdefinition, der sich heute viele klinische Autoren (wie Bingold, Dietrich, Kießling, Lenhartz u. a.) anschließen, liegt „eine Sepsis immer dann vor, wenn sich innerhalb des Körpers ein Herd gebildet hat, von dem aus konstant oder periodisch pathogene Bakterien in den Blutkreislauf gelangen, derart, daß durch diese Invasion subjektiv und objektiv Krankheitsercheinungen ausgelöst werden.“

Nach dieser Definition gibt es keine Sepsis sui generis, die durch Keimvermehrung im Blute selbst hervorgerufen würde. Sie läßt auch keine strikte Trennung zu in saprophytäre Keime und echte Parasiten oder putride Intoxikation und septische Infektion.

Anaerobier, denen häufig lediglich saprophytäre Eigenschaften zugesprochen werden, können bekanntlich Eiweiß unter Bildung von foetiden Stoffen zersetzen. Natürlich können auch diese toxischen Stoffe

ins Blut resorbiert werden, ebenso wie die giftigen Stoffwechselprodukte der aeroben Bakterien.

Und doch handelt es sich nicht lediglich um eine Intoxikation, denn das Wesen dieser Infektion besteht auch hier vorwiegend aus einem, die Bakteriämie vermittelnden Sepsisherd, niemals allein aus einer Saprämie oder Toxinämie.

Die Saprämie bedeutet ursprünglich eine Allgemeinerkrankung — analog dem Botulismus — hervorgerufen durch eine Vergiftung des Organismus durch Toxine oder Zersetzungsprodukte von Bakterien, bei der also — wie sich Birch-Hirschfeld ausdrückt — im Blute keine Bakterien, sondern Stoffwechselprodukte kreisen, die sich „als dauernd fließender Born aus dem Lokalherd in die Blut- und Lymphgefäße ergießen“.

Als wesentliches, diese Auffassung unterstützendes Moment, wurde noch hervorgehoben, daß eine Vermehrung der Fäulniskeime nur auf totem Gewebe, nicht aber im lebenden Organ möglich sei. Aus diesem Grunde wurden die Fäulniskeime zu den Saprophyten gerechnet und in bewußten Gegensatz zu den pathogenen Keimen gestellt.

Nach einer anderen Auffassung erzeugen nicht die Toxine die Erscheinungen der Saprämie, sondern vielmehr die Resorption des durch die Fäulniskeime zersetzten toten Gewebes.

Diese Anschauungen konnten neben anderen Autoren auch von Bingold widerlegt werden, der durch histologische Untersuchungen festgestellt hat, daß z. B. bei einer reinen Endophlebitis (die ohne thrombophlebitische Auflagerungen einherging!) in der Venenwand selbst, also in vitalem Gewebe einzig und allein der anaerobe Streptococcus putrificus nachzuweisen war. Auch die Tatsache, daß anaerobe Keime in sehr vielen Fällen bei thrombophlebitischer Sepsis aus dem Patientenblut gezüchtet werden konnten, — zum Teil auch ohne aerobe Begleitbakterien — spricht wohl dafür, daß auch diese Keime zu den echten Krankheitserregern gezählt werden müssen und nicht als harmlose Saprophyten angesehen werden dürfen. Bingold hat auch echte septische Endokarditisfälle beschrieben, die ausschließlich durch den anaeroben Streptococcus verursacht wurden.

Fraglos kann durch denselben Stamm von Gasbazillen

oder hämolytischen Streptokokken das eine Mal eine leichte Erkrankung, etwa eine lokale Mundhöhlenentzündung, hervorgerufen werden, das andere Mal aber eine foudroyante Sepsis.

Auch bei den gewöhnlichen Wundkrankheiten kann man ja schon alle Übergänge beobachten vom lokalen Abszeß über die engbegrenzte Lymphangitis bis zur ausgedehnten Phlegmone mit septischem Charakter. Und doch wird man kaum die hämolytischen Streptokokken oder die Fraenkel'schen Gasbazillen der erstgenannten Affektion als mindergefährliche, als Saprophyten bezeichnen können.

Bingold tritt für die Auffassung ein, daß es sich in jedem Fall von bakteriell bedingtem Fieber, z. B. in puerperio, um eine Infektion handelt und lehnt die Bezeichnung Intoxikation entschieden ab in jenen Fällen, wo anaerobe Bakterien, *Bacterium coli* und andere „Fäulniskeime“ sich an irgendeiner Wundfläche ansiedeln, objektiv und subjektiv Krankheitsercheinungen auslösen und auch ins Blut eindringen.

Die Behauptung, daß solche Anaerobier (auch wenn sie Putreszenz hervorrufen) genau so häufig wie die banalen Eitererreger in die Blutbahn übertreten können, wird vor allem bestätigt beim Durchblick des oben erwähnten klinischen Materials von Pylephlebitis-Fällen, bei denen — wie die beigefügte Tabelle beweisen soll — gerade die Anaerobier eine dominierende Rolle gespielt haben.

Doch bevor näher auf diese Bakterienbefunde eingegangen werden soll, sei noch kurz auf die

Stellung der pylephlebitischen Sepsisform im Rahmen der gesamten septischen Erkrankungen

hingewiesen.

Unter Berücksichtigung der Erfahrungstatsache, daß es im Körper verschiedene Prädispositionsstellen gibt, an denen sich die Sepsiserreger mit besonderer Vorliebe immer wieder einnisten, hat Bingold je nach der Lage des Sepsisherdes eine Tabelle der

Hauptsepsistypen

aufgestellt.

Danach hat man zu unterscheiden zwischen

I. Thrombophlebitische Sepsis.

II. Sepsis ausgehend von Hohlorganen.

Erreger: Staphylokokken, Streptokokken, Anaerobier, Bact. coli und viele andere zum Teil seltene Erreger.

III. Lymphangitische Sepsis.

(Besonders durch hämolytische Streptokokken, Pneumokokken, Pestbazillen, Fraenkel'sche Gasbazillen, Milzbrandbazillen).

IV. Endocarditis septica.

Hämolytische Streptokokken, Streptococcus viridans, Staphylokokken, Pneumokokken, Meningokokken, seltener Anaerobier.

In einem der Tabelle beigefügten Anhang werden drei weitere, in selteneren Fällen beobachtete Sepsisformen angeführt, und zwar:

1. Sepsis nach Pneumonie.

(durch Pneumokokken, Milzbrand- und Pestbazillen)

2. Sepsis bei Meningitis epidemica.

(Sepsisherd vermutlich meist Nebenhöhlen, wenn nicht am Endokard)

3. Sepsis neonatorum.

Bingold weist wiederholt darauf hin, daß diese Aufstellung keinen Anspruch auf absolute Vollständigkeit erhebt und daß immer wieder einmal Sepsisformen beobachtet werden können, die sich in dieses Schema nicht zwanglos einfügen lassen. Weiterhin wird an die Möglichkeit erinnert, daß ein jeder Infektionsherd einmal das Gefäßsystem eröffnen und so den Weg zur Sepsis bahnen kann.

Aber in jedem Fall bedeutet bei der Untersuchung hochfieberhafter, sogenannter septischer Erkrankungen die Berücksichtigung der in der erwähnten Tabelle aufgeführten Sepsisformen einen außerordentlich wertvollen Hinweis für die unbedingt erforderliche exakte Diagnosestellung.

Jede der oben bezeichneten Sepsisformen zeigt charakteristische, teilweise nur ihr allein zukommende Merkmale, die in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle eine Trennung von den übrigen Sepsistypen gestatten.

Auch die

thrombophlebitische Sepsis

entwickelt sich im Körper an bevorzugten Stellen.

Die Anzahl dieser Wetterwinkel beschränkt sich der Hauptsache nach auf:

- a) Uterusvenengebiet (Erreger: außer Staphylokokken und Streptokokken auch Anaerobier)
- b) Wurzelgebiet der Vena jugularis
 - 1. Sepsis post anginam (Erreger wie bei a)
 - 2. Sepsis nach Gesichtsfurunkeln (vorwiegend aerobe Staphylokokken und Streptokokken)
- c) Sinusgebiet (otogene Sepsis)
Neben Staphylokokken, Streptokokken und Anaerobiern nicht selten Streptococcus mucosus.
- d) Quellgebiet der Pfortader (Pylephlebitis).

Vor allem pathogene Darmbakterien und Anaerobier.

Daneben haben andere Venengebiete (Lungenarterien, periphere Venen, Varixknoten) an Zahl eine untergeordnete Bedeutung.

So kann z. B. von einem durch eine bakterielle Lungenmetastase entstandenen Lungeninfarkt aus eine Phlebitis einer Lungenvene als sekundärer thrombophlebitischer Herd auftreten. Ebenso kann bei einem nach Grippe oder zerfallendem Carcinom entstandenen Lungenabsceß die Infektion auf eine Lungenvene übergreifen und eine septische Thrombophlebitis herbeiführen.

An der Bingold'schen Klinik konnte der extrem seltene Fall beobachtet werden, daß es bei einem Patienten im Anschluß an eine Pneumonie zu einer Pneumokokken-Thrombophlebitis im Lungengebiet kam.

Auch ein Ulcus cruris, besonders auf variköser Basis, kann bekanntlich, wenn auch in seltenen Fällen, unter dem Einfluß aerober Keime zu einer infektiösen Thrombophlebitis der Beinvenen und damit zu einer septischen Erkrankung Anlaß geben.

Welche Hilfsmittel lassen sich nun heranziehen, um eine Pylephlebitis rechtzeitig zu diagnostizieren und wie hebt sich das pylephlebitische Krankheitsbild aus dem Rahmen der anderen thrombophlebitischen Sepsisformen ab?

Gerade hier tritt wie kaum bei einer anderen Sepsisform der Ausfall der

Blutkultur

entscheidend in den Vordergrund.

Voraussetzung und zur genauen Diagnosestellung unbedingt erforderlich ist natürlich, daß die Kulturen auch unter anaeroben Bedingungen angelegt werden.

Als ein außerordentlich wertvolles Verfahren hat sich an der Nürnberger Klinik die Züchtung der Bakterien (Aerobier wie Anaerobier) in der 10%igen Peptonbouillon bewährt.

Diese Methode hat sich gegenüber den sonstigen Züchtungsverfahren aus folgenden Gründen als vorteilhaft erwiesen:

1. Während in der gewöhnlichen Blutbouillon das Blut sehr bald gerinnt, sich in Schnüren zusammenzieht und in den unteren Teilen einen Blutklumpen bildet, sodaß die Keime in den seltensten Fällen in den Röhrchen sichtbar wachsen, setzt sich in der 10%igen Peptonbouillon erst beim Stehen im Brutofen nach einiger Zeit eine durchsichtige gelatinöse Plasma säule ab, in der die Kolonien isoliert sichtbar suspendiert sind.

2. Anaerobier verraten sich ebenso wie in der Blutbouillon schon durch Bildung von Glasbläschen.

3. Der Nährboden ist auch für empfindliche Keime (Gonokokken, Meningokokken, Streptococcus viridans) ein vorzügliches Nährmedium. Der Übelstand des Austrocknens nach längerem Bebrüten, der sich bei den Blutplatten störend bemerkbar macht, fällt weg.

4. Zusatz von Serum oder Ascites erübrigt sich, das Patientenblut genügt auch für das Wachstum anspruchsvoller Keime.

5. Auch spärliche Kolonien können zur Entwicklung gelangen, und zwar in den Schichten, wo die Bakterizidie nicht mehr so eingreifend wirkt.

Ähnliche Vorteile besitzt auch die Nährgelatine, aber der Fibrinplasmazylinder ist weniger durchsichtig als in der Peptonbouillon.

6. Im Blutkörperchensediment können bestimmte Keime (z. B. Gasbazillen, aber auch anaerobe Streptokokken) wochen-, ja sogar monatelang am Leben und durch Weiterverimpfung erkennbar werden. Daher darf man eine Peptonbouillonkultur nicht als negativ ansprechen, wenn keine sichtbaren Kolonien aufgehen.

Allerdings hat der Peptonnährboden auch einen Nachteil: er ist nicht immer ohne weiteres brauchbar und muß daher

unter Beachtung besonderer Vorsichtsmaßregeln hergestellt werden.

Seine Herstellung geschieht nach Schulten auf folgende Weise:

Zu einem Liter einer 10%igen Peptonbouillon fügt man 150 ccm einer 10%igen Gummi-Arabicum-Lösung und 30 ccm einer 10%igen Calcium-Chlorid-Lösung. Dann füllt man je 8 ccm in Reagenzgläser ab und sterilisiert. Diese Röhrchen werden dann in fallender Konzentration mit physiologischer Kochsalzlösung verdünnt, worauf man sie probe-weise mit ca. 1—2 ccm frisch entnommenen Blutes beschiedt. Diejenigen Röhrchen, die nach 24 Stunden die beste Gallertbildung aufweisen, zeigen an, wie man die Peptonkonzentration zu wählen hat. Die Kontrolle hat für die Neubereitung der Nährflüssigkeit immer wieder zu erfolgen, da die Peptonlösung nicht von vorneherein standardisiert werden kann.

Die Einzelheiten bei der Verarbeitung der Blutkultur sollen nur kurz skizziert werden:

Man versetzt in einem Reagenzglas 10 ccm der optimalen Peptonkonzentration mit 2 ccm eben entnommenen Patientenblutes. Diese Mischung wird auf die Dauer von 48 Stunden bei 37° in den Brutschrank gestellt. Sind in der Blutkultur Erreger angekommen, so sieht man häufig bereits in dem gallertartigen Blutbouillonzapfen kleine weiße Kolonien, evtl. sogar Gasblasen.

Zur Anreicherung wird der Inhalt der Reagenzröhrchen gut verrührt, mit Agar überschichtet und einige Stunden in den Brutschrank gestellt. Anaerobier verraten sich oft schon nach kurzer Zeit durch Gasbildung, Gestank und Zersetzung des Nährbodens. Zunächst entstehen im Agar kleine Risse, oft aber wird die Gasbildung so stark, daß Agarstücke aus dem Reagenzröhrchen herausgerissen werden.

Zur Herstellung der Reinkultur des betreffenden Bakterienstammes genügt es, eine kleine Ose Agar auf eine Zeißler-Platte auszustreichen und im Maaße'schen Apparat zu bebrüten.

Die sich immer wieder bestätigende Erfahrungstatsache, daß mit den Blutkörperchen auch Bakterien zu Boden sinken und

sich in dem Sediment monatelang am Leben erhalten können, muß besonders ausgenützt werden.

Man muß also nach mehrtägiger Bebrütung durch Heranziehung frischer Nährböden, insbesondere von Leberbouillon versuchen, etwa vorhandene Keime zur Vermehrung zu bringen. Dabei kann man manchmal die Überraschung erleben, daß nach geraumer Zeit das eine oder andere Röhrchen Gasbazillen oder andere Anaerobier aufweist, die niemals auf den Traubenzuckeragarplatten aufgegangen wären, auch wenn man sie von vorneherein im Maaße'schen Apparat unter anaerobe Verhältnisse gebracht hätte.

Lediglich zur Züchtung anaerober Keime bietet auch die sogen. Schottmüller'sche Zylinderkultur ein sehr bequemes Verfahren. Sie besteht darin, daß man etwa 75—100 ccm Zuckeragar, der sich in verflüssigtem Zustand in ungewöhnlich großen Reagenzgläsern befindet, mit ca. 20 ccm Blut versetzt. Die später erstarrte Agarsäule kann man herausgleiten lassen und wie eine Wurst in Scheiben zer schneiden; die darin befindlichen Kolonien können leicht weiterverimpft werden.

Wegen der großen Bedeutung, die vor allem die anaeroben Streptokokken als Sepsiserreger haben, sei hier erwähnt, daß diese obligat anaerob wachsenden Keime in ihren Oberflächenkolonien porzellanweiß und ohne Hämolyse sind. Die Einzelglieder sind meist in Diploform, seltener in Stäbchenform angeordnet. Häufig wird dieser Erreger in Symbiose mit einem gramnegativen Stäbchen, etwa von der Größe des Influenzabazillus vorgefunden. Schottmüller hat diesen Keim daher *Bacillus symbiophiles* genannt.

Durch eine von Zeißler besonders ausgebaute Methodik können auch andere Anaerobier (wie Fraenkel'sche Gasbazillen, *Bacillus saccharobutyricus immobilis* Schattenfroh-Graßberger ufw.) differenziert werden.

Die oben angegebenen Verfahren lassen erkennen, daß die Verarbeitung der Kulturen besonderer Sorgfalt bedarf. Solche subtilen Untersuchungsmethoden müssen besonders bei dem Verdacht eines Sepsisherdes im Pfortadergebiet herangezogen werden, weil gerade bei dieser Erkrankung die Blutkultur lange nicht so oft ohne weiteres positiv ausfällt wie bei den übrigen thrombophlebitischen Sepsisformen.

Denn da eine Keimeinschwemmung ins Blut von pylephlebitischen Herden her doch bereits zumeist im Lebervenenfilter

aufgehalten wird, sind die Keime, die noch im peripheren Kreislauf erscheinen, meist weniger zahlreich als in anderen thrombophlebitischen Herden, zum Beispiel im Uterusgebiet.

Unter Umständen muß die Blutentnahme und Anlage der Kultur mehrmals wiederholt und mehrere Tage lang durchgemustert werden. Ein negativer Befund ist erst dann zu erheben, wenn sowohl unter aeroben und anaeroben Verhältnissen auch nach mehreren Tagen und nach mehrmaliger Weiterverimpfung die verschiedenen Nährböden völlig steril geblieben sind.

Besonders berücksichtigt muß auch der Zeitpunkt werden, an dem die Ausaat vorgenommen wird.

Die Erfahrungen, die von Schottmüller in einer speziell für die Sepsisforschung eingerichteten Abteilung gewonnen wurden, haben auch in späteren Jahren immer wieder bestätigt, daß sich Sepsiserreger vor allem vor oder zu Beginn eines Schüttelfrostes im Blute finden und dann an Zahl rasch abnehmen. Daher ist die Blutkultur auch während des Fieberanstieges und zu Beginn des Schüttelfrostes am erfolgreichsten. Am Ende des Schüttelfrostes sind — besonders bei der Thrombophlebitis, bei der die Keime nur schubweise ins Blut gelangen — kaum mehr Erreger im Blute zu finden. Hier wirken nur noch die Endotoxine der bereits zugrundegegangenen Bakterien. Demnach ist der Schüttelfrost desto intensiver, je mehr Erreger durch das Blut, bzw. durch die Organe, nach denen sie verschleppt werden, abgetötet werden.

Die bakteriologischen Untersuchungen des Blutes haben nun erkennen lassen, daß die banalen Eitererreger (Staphylokokken, Streptokokken) wohl eine große Rolle bei der Thrombophlebitis im Uterusgebiet spielen, daß aber in anderen Venengebieten gerade die Anaerobier als die exquisiten Erreger der thrombophlebitischen Sepsis zu gelten haben.

Dies erklärt sich aus der

Bakterienflora an Ort und Stelle der Infektion.

Anaerobier sind stets vorhanden in der Mundhöhle. Sie können also von einer Angina aus auf das Venengebiet übergreifen und dort eine thrombophlebitische Sepsis auslösen.

Zu den in der Mundhöhle vorhandenen Bakterien gehören neben den verschiedenen Streptokokken, Diplokokken und Staphylokokken auch *Bact. fusiforme*, *Bacillus phlegmones emphysematosae* Fraenkel, *Bacillus putrificus* Bientock und andere Anaerobier.

Wir finden anaerobe Keime weiterhin bei alten eitrigen Mittellohrentzündungen.

Bei einer Sinus- oder Jugularisphlebitis können aus dem Blute häufig *Bact. proteus*, *Pyocyaneus*, *Streptococcus mucosus*, *Bact. Friedländer*, *Tetragenus*, *Bact. fusiforme* und andere anaerobe Erreger gezüchtet werden.

Auch im weiblichen Genitale können sich Anaerobier ansiedeln.

Zu den wichtigsten Typen der Vaginalflora gehören neben den feinen Doederlein'schen Scheidenbazillen Streptokokken, Anaerobier und *Bact. coli*. Schottmüller konnte den *Streptococcus anaerobicus* in 30 % der Fälle als Erreger des Puerperalfiebers nachweisen.

Die Bedeutung der Anaerobier bei der Pfortader-entzündung erklärt sich vor allem daraus, daß sie zu den ständigen Bewohnern des Darmes gehören. Darüber hinaus können sich natürlich noch zahlreiche andere Darmbewohner am Zustandekommen einer Thrombophlebitis im Gebiet der Vena portae beteiligen.

Bekanntlich spielen unter physiologischen und pathologischen Verhältnissen zahlreiche Bakterien im Neugeborenen-, im Kinderdarm und beim Erwachsenen eine Rolle:

Unter physiologischen Verhältnissen weist der menschliche Darm sowohl beim Säugling und Kind, als auch beim Erwachsenen eine konstante und charakteristische Flora auf.

Nur im Darm des Neugeborenen fand Nissle — entsprechend den verschiedenen Eintrittspforten — eine sehr gemischte Besiedlung vor, doch bereits am zweiten oder dritten Lebenstag traten an ihre Stelle konstante und charakteristische Darmbewohner.

Der Dünndarm zeigt normalerweise bis zu seinem untersten Abschnitt Keimarmut. Im Magen und Duodenum werden während der Verdauung Enterokokken, Milchsäurebazillen und Hefen angetroffen.

Zur normalen Dünndarmflora des gesunden Erwachsenen gehören vor allem Enterokokken, *Bact. coli* und *Bact. lactis aerogenes*, daneben uncharakteristische Staphy-

kokken und verschiedene, die Gelatine verflüssigende Keime, Sarcine und Hefen; seltener findet sich der *Bacillus acidophilus*.

Im Gegensatz zum Dickdarm darf die Dünndarmflora als verhältnismäßig artenarm bezeichnet werden. Häufig sind im Dünndarm auch fremde Keime anzutreffen, die rein zufällig mit der Nahrung zugeführt worden sind.

Der Dünndarm des Säuglings ist nach den Untersuchungen von Moro, Little u. a. ebenfalls sehr keimarm. Es finden sich *Bact. coli*, *Bact. lactis aerogenes*, Enterokokken, gelegentlich *Bacillus acidophilus* und *Bacillus bifidus*.

Beim künstlich genährten Säugling überwiegen häufiger die Enterokokken.

Die Dickdarmflora, die im wesentlichen als identisch mit der Stuhlflora angesehen werden darf, ist weit zahlreicher und mannigfaltiger.

Unter den aeroben Darmbewohnern herrscht das *Bact. coli* vor, seltener werden *Bact. lactis aerogenes*, andere milchsäurebildende Stäbchen, Heubazillen, Kokken, Hefen und Oidien angetroffen.

Unter den Anaerobiern ist besonders der Fraenkel'sche Gasbazillus (identisch mit dem *Bacillus perfringens* Tissier der Franzosen), apathogene Buttersäure-Bazillen, der *Bacillus putrificus* Bienstock und *Bacillus symbiophiles* Schottmüller zu nennen. Häufig finden sich auch fusiiforme Bazillen und *Spirochaeten*.

Von den pathogenen Anaerobiern werden im gesunden Darm neben dem ständig vorhandenen, bereits erwähnten *Bacillus emphysematosae* Fraenkel in seltenen Fällen auch Tetanusbazillen und Bazillen des malignen Ödems angetroffen.

Die Dickdarmflora des Säuglings ist durch das starke Übergewicht des *Bacillus bifidus* charakterisiert, gegen den die übrigen Darmbewohner, *Bacterium coli*, *Bacillus acidophilus*, *Bact. lactis aerogenes*, Enterokokken und Sporenbildner aus der Gruppe der Buttersäurebazillen zahlenmäßig zurückstehen. Seltener findet man in Brustmilchstühlen *Staphylococcus albus*, *Bac. putrificus* und Hefen.

Die Zusammenfassung der Stuhlflora künstlich genährter Säuglinge ist im allgemeinen verschiedenartiger und weniger konstant. Doch auch in ihr sind die Haupttypen des Brustmilchstuhles ebenfalls vorhanden.

Aus dem Kalkseifenstuhl der Säuglinge konnte Kleinschmidt regelmäßig 3—4 Anaerobenarten züchten, und zwar unter 8 Fällen einer Versuchsreihe je fünfmal den Fraenkel'schen Gasbazillus und den *Bac. amylobacter*, je achtmal den *Bac. putrificus verrucosus* und den *Bac. putrificus tenuis*. Letzterer scheint ein speziell im Kalkseifenstuhl hervortretender Darmbewohner zu sein.

Als Erreger des akuten infektiösen Darmkatarrhs der Säuglinge und Kleinkinder macht Finkelstein die Arten der Coligruppe, Streptokokken, Paratyphusbazillen und vor allem Dysenteriebazillen verantwortlich. Gelegentlich kommen auch unter anderem Pneumokokken, *Pyocyaneus* und *Bact. proteus* in Betracht.

Bei Darmkatarrhen der Erwachsenen sind Paracolibakterien, Proteusbazillen und Enterokokken in größerer Zahl vorhanden.

Die verschiedenen Anaerobier, die nach Darminfektionen in thrombophlebitischen Herden gefunden werden, sind im wesentlichen mit den unter physiologischen Verhältnissen im Darm vorhandenen Anaerobiern identisch.

In Arbeiten von Brütt, Sinakenc, Löhr und Raßfeld, welche sich mit der Bakteriologie der Appendicitis und der appendiculären Peritonitis befassen, wird besonders die Bedeutung der Anaerobier bei den jauchigen Prozessen des Wurmfortsatzes hervorgehoben. Löhr und Raßfeld fanden in der kranken Appendix neben anderen Anaerobiern in 79 % der Fälle Fraenkel'sche Gasbazillen. Daneben wurde auch noch der anaerobe *Streptococcus putrificus* und die verschiedenartigsten Aerobier gefunden. Der putride Geruch entsteht sowohl durch die Tätigkeit des *Bacillus putrificus tenuis* (*Bac. bifermentans*) wie durch den *Streptococcus putrificus* und nicht zuletzt durch fusiiforme Bakterien. Nach Befunden von Löhr und Raßfeld handelt es sich bei der Appendicitis um eine endogene Infektion mit ortsanwässiger Flora.

Der *Bacillus putrificus* Bienstock wird von Passini und Korentschewsky u. a. als ein konstanter Bewohner des menschlichen Darmes bezeichnet. Er ist ein beweglicher Butter säurebazillus, gilt als Erreger der Eiweißfäulnis und zählt zu den anaeroben Sporenbildnern, ebenso wie die gleichfalls im Darm nachzuweisenden Butter säurebazillen Schattenfroh-Graßberger (unbeweglich) und der bewegliche Butter säurebazillus amylobacter Gruber.

Bei genauen Untersuchungen der Kulturen des *Bacillus putrificus* Bienstock durch Kleinschmidt erwies sich dieser Erreger als eine Mischung aus dem *Bac. putrificus verrucosus* und dem *Bac. amylobacter*.

Die Frage seiner Pathogenität ist noch nicht restlos geklärt. Bienstock, Graßberger, Schattenfroh, Passini, Tissier halten ihn für apathogen, doch Korentschewsky, Weinberg, Rodella, v. Hibber sprechen ihm zwar eine schwache, aber doch deutlich nachweisbare Pathogenität zu. Weitere Untersuchungen müssen Aufschluß geben, ob pathogene von apathogenen Stämmen scharf zu trennen sind oder ob Umwandlungen vorkommen. Ein ebenfalls im Darm vorkommender Anaerobier, der *Bac. paraputrificus* Bienstock ist wahrscheinlich eine Variante des *Bac. putrificus*. Er spaltet außer Eiweiß auch mehrere Kohlehydrate.

Der aerob wachsende *Bac. lactis aerogenes* ist nach Nissle wahrscheinlich identisch mit dem *Bac. acidilactici*. Der apathogene *Bac. acidophilus* Moro gehört zu den „langen Milchsäurebazillen“, er wächst sowohl aerob als auch anaerob.

Ausgeproben anaerob wächst der *Bac. bifidus* Tissier; er herrscht im Darm vor bei zuckerreicher und eiweißarmer Nahrung.


Der *Enterococcus* ist nach der Anschauung von Tavel und Egnat ein normaler Darmbewohner, der erst bei Darmerkrankungen seine pathogene Wirkung entfaltet. Außerhalb des Magen-Darmtrakts verursacht dieser Erreger Krankheitsprozesse. Er wird gefunden bei Eiterungen, die mit dem Darm in Zusammenhang stehen, daneben spielt er bei Infektionen der Gallen- und Harnwege eine Rolle.

Aus dieser Zusammenstellung ist zu ersehen, daß von den Anaerobiern Fraenkel'sche Gasbazillen und die verschiedenen anaeroben Streptokokkenarten immer im menschlichen Darm vorhanden sind.

Da sich alle diese Keime — wie bereits erwähnt — am Zustandekommen einer Thrombophlebitis im Darmbereich beteiligen können, muß bei entsprechender Kulturmethodik auch ihre Züchtung aus dem Blute gelingen.

Die Pathogenese des pylephlebitischen Krankheitsbildes
ergibt sich ohne weiteres, wenn man das gesamte Ausbreitungsgebiet der Vena portae berücksichtigt. Die Pfortader sammelt das Blut von der Cardia bis zum Musculus levator ani. Sie nimmt also das Blut von der Vena gastropiploica des Magens,

aus der Vena lienalis und aus der Vena mesenterica inferior, die das Blut über die Kolikavenen aus dem Dickdarm fort schafft.



Infektionswege in den Verzweigungen der Pfortader.

Ein infektiöser Prozeß im Versorgungsgebiet der oben genannten Venen wird also stets die Symptome der Pylephlebitis oder — wie die Krankheit wegen ihrer Lokalisation noch genannt wird — der enterogenen Sepsis auslösen.

Arten der Primärinfektion.

Der Sitz der Primärinfektion innerhalb des Darmbereichs kann sehr verschieden sein, aber im wesentlichen sind es doch nur einige wenige Krankheiten, die die Veranlassung zur Entstehung einer Pylephlebitis geben.

1. In den meisten Fällen wird die Infektion von einer Appendicitis aus vermittelt. Ganz besonders gefährdet ist hier das Ausbreitungsgebiet nach der Vena ileocolica hin.

Nach einer Statistik von Brütt traten an der Eppendorfer I. medizinischen Klinik unter 2500 Fällen von akuter Appendicitis nur 15 mal, d. h. in 0,6% eine eitrige Pylephlebitis ein. In diesen Fällen handelte es sich um schwere gangränöse Wurm-

fortschreitungen, meist mit Abszeßbildungen. Die Statistik hebt hervor, daß nach der Frühoperation innerhalb der ersten 24 Stunden nie eine Pylephlebitis beobachtet wurde und daß von den 15 Fällen nur 6 mit Schüttelfrost verliefen.

Eine große Statistik stammt auch aus dem Mt. Sinai-Hospital, New-York: Von 1916-1925 waren unter den 2841 akuten Appendicitiden nur 9 Fälle von Pylephlebitis. Auch hier betont der Autor, daß die Pfortaderthrombose sich erst Tage oder Wochen später bemerkbar machen kann, ohne daß peritoneale Erscheinungen vorhanden sind.

Aus einer Zusammenstellung von Langdon Brown, die 46 Pylephlebitisfälle der Weltliteratur umfaßt, ist zu ersehen, daß in 42% der Fälle eine Entzündung des Wurmfortsatzes die Ursache der Erkrankung war.

Doch die Tatsache, daß es nach Appendicitis zu dem selbstständigen Krankheitsbild einer Pylephlebitis kommen kann, scheint noch nicht allgemein bekannt zu sein. So stellte 1930 ein französischer Autor mittels dreier Fälle von Appendicitis mit anschließenden Schüttelfrösten ein neues Krankheitsbild auf.

2. Auch weiter schreitende Infektionen, die von Verletzungen im Haemorrhoidalvenengebiet ausgehen, können zu einer Pylephlebitis führen. Hier wird besonders die Vena haemorrhoidalis superior befallen.

Aus einer Krankengeschichte der Nürnberger Klinik vom Juli 1929 sei folgender Fall entnommen, der wegen des negativen Bakterienbefundes im Blut nicht in die unten angegebene Tabelle aufgenommen werden soll.

Es handelte sich um einen Patienten, der drei Wochen nach einer Haemorrhoidaloperation von Frösteln und in der darauffolgenden Nacht von einem sehr starken Schüttelfrost befallen wurde. Er klagte über geringe Schmerzen im rechten Schultergelenk, sonst war er — abgesehen von den üblichen Begleiterscheinungen des Schüttelfrostes — beschwerdefrei. Am 6. und 7. Juli hatte er 3 weitere Schüttelfröste.

Zu bemerken wäre noch, daß der Patient nach der Operation im Juni 1929 mit noch nicht völlig geschlossener Wunde aus dem Krankenhaus entlassen wurde.

Am 12. Juli erfolgt Aufnahme in der medizinischen Klinik. Die Temperatur schwankte um 38°. Am 15. Juli war ein ausgesprochener Herpes labialis vorhanden. Nachts bekam er einen sehr heftigen Schüttelfrost. Nun wurde der Patient jedesmal auch nach behutsamer Verabreichung von Ölklysmen zwecks Herbeiführung von Stuhlgang von einem

Schüttelfrost befallen. In der Zwischenzeit bestand Fieberfreiheit, irgendwelche Krankheits Symptome waren nicht zu konstatieren. Vom 3. August ab bestand eine Continua, die Leukozyten stiegen über 11.000 an. In der Gegend des linken Hüftgelenks bestand eine starke Druckempfindlichkeit. Das Hüftgelenk selbst war frei, aber in der Tiefe der Glutealmuskulatur hatte sich ein Entzündungsherd entwickelt. Dieser ging spontan langsam zurück.

Sicher ist auch dieser Fall dahingehend zu bewerten, daß es im Anschluß an die Haemorrhoidalvenenoperation zu einer nicht sehr stark ausgeprägten Thrombophlebitis im Bereich des unteren Abschnittes der Haemorrhoidalvenen gekommen war. Die Schüttelfröste, d. h. die Bakteriämien kamen hier durch mechanische Einflüsse zustande, durch den Druck auf die infizierte Vene bei der Defaecation.

Drei im Schüttelfrost angelegte Blutkulturen blieben steril; sicherlich deshalb, weil die Anlage nicht auch unter anaeroben Verhältnissen erfolgte.

3. Selbstverständlich kann auch von jedem anderen Darmabschnitt aus, der von einem entzündlich geschwürigen Prozeß befallen ist und dessen Vene mit dem Pfortadersystem in Verbindung steht, eine Pylephlebitis entstehen.

So kann zum Beispiel ein Ulcus ventriculi zu einer septischen Pfortaderentzündung Anlaß geben. Bingold hat einen derartigen Fall beschrieben und weist auf die Seltenheit dieses Entstehungsmodus hin. Reiche dagegen führt unter zwölf Pylephlebitisfällen allein drei Fälle nach Ulcus ventriculi an.

4. Auch bei septischen Cholangitiden wurde wiederholt ein Übergreifen des Prozesses auf die Pfortader beobachtet.

Lenhartz sen. hat mehrere derartige Fälle beschrieben. Darunter befanden sich auch solche mit Pneumokokken als Erreger; ob auch unter anaeroben Verhältnissen gezüchtet wurde, war nicht mit Sicherheit festzustellen.

An der Nürnberger I. medizinischen Klinik konnte erst kürzlich ein Fall beobachtet werden, bei dem neben Colibazillen auch intrahepatisch anaerobe Streptokokken aus den verschiedensten Stellen gezüchtet werden konnten.

Diese Keime führten dann zu der seltenen Endocarditis septica durch Anaerobier, an der der Patient ad exitum kam.

5. In seltenen Fällen kann auch nach Diverticulitis eine Pylephlebitis auftreten.

Bei Reiche und in der ausländischen Literatur werden einige Fälle beschrieben. Kramer und Robinson haben einen Fall von „Diverticulitis mit sekundärem Leber- und Hirnabszeß“ veröffentlicht. Auch Frank Bodmer erwähnt einen solchen Fall.

Bingold beschreibt eine Sepsis mit über 30 Schüttelfrösten bei einem Patienten, bei dem $\frac{1}{4}$ Jahr vorher durch eine Röntgenuntersuchung zahlreiche Divertikel im Sigma festgestellt worden waren. Da ein Sepsisherd nirgends feststellbar war, mußte per exclusionem angenommen werden, daß eine Diverticulitis zu einer Thrombophlebitis im Pfortadergebiet geführt haben mußte, insbesondere, da häufig im Gefolge der Defaecation stürmische Schüttelfröste auftraten. Merkwürdigerweise hörten die Schüttelfröste gerade dann auf, als ein operativer Eingriff ernstlich in Erwägung gezogen wurde.

6. Eine nicht unwesentliche Quelle stellen auch die Carcinome des Rektums und in selteneren Fällen auch die Neoplasmen des Magens dar.

Bei den von uns beobachteten Fällen traten nur teilweise Schüttelfröste auf, dann waren wieder wochenlang normale Temperaturen feststellbar. Hier hatte es den Anschein, als habe das Carcinom die infizierten Venen durchwuchert und abgeriegelt.

Bei einer von einem Rektumcarcinom ausgehenden Sepsis konnten im Blute Coli- und Gasbazillen gezüchtet werden. Diese Erreger führten zu einer Metastase in der Gefäßgegend, wo sie aus dem gashaltigen Abszeß wieder durch Punktion gewonnen und erneut gezüchtet werden konnten.

Da über den weiteren Verlauf dieser Erkrankung nichts Näheres bekannt ist, soll auch dieser Fall nicht in die untenstehende Tabelle aufgenommen werden. Trotzdem ermöglichte auch in diesem Falle das Ergebnis der Blutkultur in Verbindung mit der Ursprungserkrankung und der metastatischen Prozesse die exakte Diagnosenstellung auf Pylephlebitis.

7. Gelegentlich können auch Milzinfektionen zu Pfortaderentzündungen Anlaß geben.

Schon Lenhartz sen. hat einen derartigen Fall beschrieben. Ein analoger Fall wurde von Schottmüller-Bingold publiziert: Es handelte sich um einen Milzinfarkt, der im Anschluß an eine Lungengangrän auftrat und zur Verjauchung kam. Es entwickelte sich in der Nachbarschaft eine gangränescierende putride Thrombophlebitis der Milzvene und von hier aus entstand eine Pylephlebitis.

Bei einem anderen Fall kam es von einer bronchiektatischen tiefsitzenden Caverne aus zu einem Übergreifen auf Zwerchfell und Milzkapsel und von hier aus entwickelte sich ebenfalls eine Thrombophlebitis im Pfortadergebiet.

Ein ähnlicher Fall konnte an der Nürnberger I. medizinischen Klinik beobachtet werden (siehe Seite 26, Fall Nr. 5!).

8. Auch durch Fremdkörper kann gelegentlich eine Pylephlebitis verursacht werden. So sah Reiche bei der Sektion eine Getreidegranne, die sich in die Pfortader eingebohrt hatte, Lambson eine Fischgräte, v. Jahn ein Stück Draht, Strümpel eine Stecknadel, Pel ein Borstenhaar.

Die an der Nürnberger Klinik beobachteten Pylephlebitisfälle.

Verschiedene der oben angeführten Entstehungsmodi waren auch bei den an der I. medizinischen Klinik in Nürnberg beobachteten Pylephlebitisfällen zu verzeichnen.

In der weitaus überwiegenden Mehrzahl der Fälle konnte die frühzeitige Diagnose dieser prognostisch so ungünstigen Erkrankung lediglich aus dem bakteriologischen Befund der Blutkultur gestellt werden.

Im folgenden soll eine Übersicht gegeben werden über die in den letzten 8 Jahren an der Klinik beobachteten Pylephlebitisfälle mit besonderer Berücksichtigung der Bakterien, die jeweils im Blute nachgewiesen werden konnten.

Übersicht der an der Nürnberger Klinik beobachteten Pylephlebitisfälle.

Diagnose	Bakteriolog. Blutbefund	Ausgang	Bemerkungen	Sektionsbefund
1. Pylephlebitis nach Appendicitis	Colibazillen. Enterokokken, anaerobe Streptokokken u. Baz. lymphophiles. Im Schüttelfr. gezüchtet.	Exitus nach gehäuften Schüttelfrösten am 23. Krankheitstag. Einlieferung 3 Tage ante Exitum.	Ausgang von Appendicitis erst bei der Obduktion mit Sicherheit feststellbar. Klinisch Vermutungsdiagnose.	Nach Obduktionsbefund chirurg. Eingriff wegen des bei Einlieferung ins Krankenhaus bereits zu weit fortgeschrittenen Proz. in den Pfortaderverzweigung, in der Leber absichtslos gewesen.
2. Desgleichen	Anaerobe Streptokokk., Coli, Gas-Odembaz. im Blut 2 mal nachgewiesen.	Exitus am 15. Krankheitstag, täglich mehrmals Schüttelfröste.	Am 12. Krankheitstag hohe Leukozytose, Leberabzef. Operation wegen des zu elenden Zustandes nicht möglich.	Obduktion verweigert.
3. Pylephlebitis nach Sigmoiditis?	Bact. coli, anaerobe Streptokokk. einmal im Blut nachgewiesen. 2 Blutkulturen steril.	Nach dem 19. Schüttelfrost, der besonders heftig war, fieberfrei geblieben.	Sigmoiditis röntgenologisch wahr(dreimlich).	—
4. Nach Magencarcinom	Anaerobe Streptokokk., aerobe Staph. In der 2. Blutkult. neben diesen Keimen grampositive Stäbchen?	Niedrige Temperaturen, unterbrochen von 4—5 Schüttelfrösten, Dauer 2 Monate. Diagnose anfangs unklar. 3 Tage nach Magenoperation Exitus.	Keine Leberca — Metastasen, aber verlauchter apfelgroßer Leberabzef. Eiterabgang im Stuhl.	Obduktion verweigert.
5. Pylephlebitis nach Lungenabzef	Im Blut Staphylokokk. u. fäulnisbild. Farberfäulnisbild. Mikroorganismen nachzuweisen. D. Staphylokokk. wachsen aerob.	Exitus.	Am 17. Krankheitstag Beginn m. Schüttelfrösten, die sich alle 2—3 Tage wiederholen. Diagnose erst bei der Obduktion.	Durchbruch des Abscesses durch das linke Zwerchfell. Sekundärer Milzabszef. Von hier aus Thrombophlebitis d. Vena lienalis, fortgeleitet bis fast zum Pfortaderstamm.

Diagnose	Bakteriolog. Blutbefund	Ausgang	Bemerkungen	Sektionsbefund
6. Appendicitis.	Anaerobe Streptokokk., Fraenkel'sche Gasbaz. sind nur durch Verarbeitung d. Blutkörperchen sediments nach 4 Tg. festzufallen.	Stürmischer Verlauf. Exitus 6 Tage nach den ersten Krankheitszeichen.	Klin. keine Zeichen für Appendicitis. Diagnose Pylephlebitis nur wegen des Anaerobierbefundes. 14 Jahre altes Kind.	Multiple Leberabszesse. Ausgedehnte eitrige Thromben im Pfortadergebiet. Nach Obduktionsbefund wäre chirurg. Eingriff aussichtslos gewesen.
7. Appendicitis. Pylephlebitis.	Colibaz., Enterokokk., in d. 2. Blutkultur daneben auch gramposit. anaerobe Stäbchen.	Operation: Unterbindung der Vena ileocolica. Schüttelfröste gehen weiter. Exitus am 32. Krankheitstag.	—	Leberabszesse. Peripyleptischer Abscess in der Gegend der Pfortadermündung.
8. Hämorrhoidalabszess.	Anaerobe Streptokokk., Gasbaz., erst nach 4 Tg. d. Verarbeitung d. Blutkörperchen sedimentes festsellbar.	Exitus nach 2 tägiger Beobachtung.	Vorher uncharakteristische Erscheinung, vermutlich 3—4 Schüttelfröste im 14 tägigen Verlauf.	Peripröktischer Gasabszess. Obduktion: Veneninfektion nur in dichter Nachbarschaft des Gasabszesses.
9. Appendicitis.	Colibaz., Enterokokken? Aerobe Streptokokk. Baz. symbiotisches. 3 Blutkulturen vorher negativ.	Nach scheinbar erfolgreicher Operation 10 Tg. Fieberfreiheit, dann stürmischer Verlauf mit 35 Schüttelfrösten.	Vermutlich erst einige Tage nach der Operation Entwicklung von Leberabszessen.	Metastatisch multiple Leberabszesse. Pylephlebitis auch oberhalb der Unterbindung weitergewandert.
10. Appendicitis im Verlauf von Scharlach.	Hämolyf. Streptokokk. Colibazillen.	14 tägiges Krankheitsbild mit Schüttelfrösten. Exitus.	Wegen des Bestehens einer gleichzeitigen Angina Diagnose schwer zu stellen, nur vermutet wegen der Colibazillen.	Wenig ausgedehnte Thrombophlebitis im Bereich der V. ileocolica. Operation hätte erfolgreich sein können.

Diagnose	Bakteriolog. Blutbefund	Ausgang	Bemerkungen	Sektionsbefund
11. Pylephlebitis.	Colibaz., anaerobe Streptokokk., gramposit. Stäbch. (Fraenkel-Typ.) 3 Blutkulturen negativ!	Exitus am 28. Krankheitstag.	Vorher Koliken, die auf Cholecystitis hinarwiesen. Wenig Ikterus. Klin. für Pylephlebitis kaum verwertbare Befunde. Operation wurde erwogen, wäre aber aussichtslos gewesen.	Pylephlebitis bis zu den Pfortadervverzweigungen. Cholecystitis.
12. Ca. rekti.	Staphylokokk., anhä-molyt. Streptokokk., Enterokokk., Gasbaz., anaerobe Streptokokk. Aerobe Keime nach 48 Std. angegangen. Anaerob. erst nach Verarbeitg. d. Blutkörperchen-sediments nach 8 Tagen sicher identifizierbar.	Subfebrile Temperatur. 4 Schüttelfröste in etwa 8 täglichen Pausen. Ca-Symptome kaum vorhanden. Keine Verdauungsbeschwerden. Krankheitsgefühl erst mit Einsetzen des Fiebers.	Ca nicht mit Sicherheit diagnostizierbar. Angenommen war eine Sigmoiditis. Krankheitsbild uncharakteristisch. Einige Schüttelfröste geben zur Blutkultur Veranlassung.	Hochstehendes tiefgreifendes Rectum-Ca.
13. Pylephlebitis nach Appendicitis.	Unter anaeroben Bedingungen wuchsen anaerobe Streptokokken, Gasbaz. u. Baz. (zymobiophyl. 2 Blutkulturen vorher steril).	17 Tage nach Krankheitsbeginn Eröffnung eines periphlebit. Abzesses, Drainage. Venenunterbindung aus technischen Gründen unmöglich. Exitus am 47. Krankheitstag.	Über 50 Schüttelfröste! Klin. keine Zeichen für Appendicitis. Diagnose wurde intra-vital per exclusionem auf Pylephlebitis gestellt wegen des Anaerobierbefundes.	Putride thrombophlebitis. Einschnürung großer Bezirke der Pfortaderäste. Jauchiger Leber- und Milzabscess.

Diagnose	Bakteriolog. Blutbefund	Ausgang	Bemerkungen	Sektionsbefund
14. Pylephlebitis, wahrscheinlich n. Appendicitis.	Enterokokken u. Parakolibakterien.	Heilung nach Unterbindung der Vena colica dextra.	11 Tage lang Fieber. 2 Schüttelfröste, öfter Frostgetümel. Bei der Laparotomie zeigt sich im Douglas fibrinöses Exsudat u. entzündl. Veränderg. des perityphlitischen Gewebes	
15. Pylephlebitis nach Appendicitis.	Anaerobe Streptokokk. Baz. lymphophilus.	Exitus in der 5. Krankheitswoche.	Zahlreiche Schüttelfröste. Leukocytose, multiple Leberabszesse.	Perforierte Appendicitis mit umschriebener Abzessbildung. Thrombose der Pfortaderäste bis an d. Leberhilus. Multiple Leberabszesse. Umschriebene Peritonitis.
16. Pylephlebitis, ausgehend von der Appendix.	Anaerobe Streptokokk.	Am 23. Krankheitsstag Laparotomie: Eröffnung einer faußgroßen Abszeshöhle an der rechten hinteren Bauchwand. Tamponade. Exitus 4 Tg. post operationem.	Zeitenweise täglich mehrfache Schüttelfröste. Leukocytose von 35.000.	Obduktion verweigert.
17. Pylephlebitis nach Haemorrhoidalveneninfektion.	Bact. coli, anaerobe Streptokokk., anaerobe gramnegative Stäbchen.	Spontanheilung nach Bildung eines perityphlit. jauchigen Abszesses und eines kleinen Leberabscesses.	Mehrere Schüttelfröste, zum Teil 2 mal tgl. Im Punktat der perityphlit. und des Leberabscesses der gleiche bakteriologische Befund wie in der Blutkultur. 25.000 Leukozyten.	—

Diagnose	Bakteriolog. Blutbefund	Ausgang	Bemerkungen	Sektionsbefund
18. Periproktitischer Abzess, Anaerobier-Septis.	Anaerobe Streptokokk. Eine 2. Blutkultur blieb steril. Gasbaz. wurden intravital nicht gezüchtet.	Incision eines paraproktitischen Abzesses am 15. Krankheitstag, kurz darauf Exitus letalis.	Am 15. Krankheitstag nach zahlreichen Schüttelfröhen geringe Rötung und Infiltration in der Dammgegend. Leukozytose.	Incidierter periproktitischer Abzess in der Dammgegend. Gasphegmone des rechten Oberdarmkells, des Dammes, der Glutealmuskulatur. Gasbrand des Beckenbindegewebes und des retroperitonealen Gewebes. Infektiöse Milzschwellung.
19. Pylephlebitis-verdacht.	Anaerobe Streptokokk. Bact. coli.	Exitus.	Einige Tage vor Beginn der flüchtigen Erscheinungen Angina. Trotzdem wurde wegen des Blutbefundes Verdacht auf Pylephlebitis ausgesprochen. Im Vordergrund der klinischen Erscheinung stand ein embolisch entstandener Lungenherd.	Ulceröse handflächengroße Schleimhautaffection ca. 1 1/2 handbreit über dem Sphincter ani. In vivo nicht diagnostizierbar.
20. Ca recti.	Anaerobe Streptokokk. Gasbazillen.	Exitus.	Mehrere Schüttelfröhe. Foetide gashaltige Phlegmone in der Glutealgegend.	Gasphegmone in der Umgebung des carcinomatösen Gewebes im oberen Teil des Rektums. Venen mit foetid-citrigen Thrombenmaterial angefüllt.

Im Verlaufe der letzten 8 Jahre konnten noch verschiedene analoge Fälle beobachtet werden. Die Aufnahme in diese Tabelle soll unterbleiben, weil in diesen Fällen entweder die Blutkulturen — die teilweise ohne Berücksichtigung der anaeroben Verhältnisse angelegt wurden — negativ ausfielen oder weil wegen besonderer Umstände eine längere Beobachtung des Patienten nicht möglich oder aber, weil bei letalem Ausgang die Bestätigung einer Vermutungsdiagnose wegen Sektionsverweigerung nicht erbracht werden konnte.

Es könnte noch über fünf weitere Fälle berichtet werden, bei denen es nach Appendektomien zu Schüttelfrösten kam, die aber spontan zur Ausheilung kamen. Da aber die Blutkulturen negativ blieben, wollen wir hier eine Pylephlebitis (die von selbst zum Stillstand kam) nur als sehr wahrscheinlich annehmen. Unterstützt wurde die Vermutung besonders durch den Verlauf eines Falles, bei dem es vier Wochen später zu einem putriden Leberabszeß gekommen war, der durch Punktion entleert werden konnte. Leider wurde der Eiter nicht bakteriologisch untersucht.

Bei zwei anderen vermuteten Pylephlebitiden war der Ausgangspunkt völlig unbekannt.

Unterziehen wir nun die Befunde in obiger Tabelle einer näheren Betrachtung, so lassen sich daraus verschiedene Schlussfolgerungen ziehen.

I. Bakteriologischer Befund.

Hinsichtlich des bakteriologischen Befundes läßt sich daraus folgendes entnehmen:

Unter 20 Fällen von infektiöser Thrombophlebitis im Pfortadergebiet konnten im Blute 17 mal, d. h. in 85% Anaerobier nachgewiesen werden.

9 mal gingen nebeneinander verschiedenartige anaerobe Erreger in der Blutkultur an.

Anaerobe Streptokokken waren in 15 Fällen, *Bacillus emphysematosae* Fraenkel 7 mal definitiv, 1 mal wahrscheinlich nachweisbar, 4 mal konnte der *Bacillus symbiophiles* Schottmüller und je 1 mal ein gramnegatives bzw. ein grampositives anaerobes Stäbchen gezüchtet werden.

Unter den anaeroben Erregern stand also an erster Stelle

der anaerobe Streptococcus, dann folgten die Erreger der Gas-ödemgruppe neben dem Bacillus symbiophiles Schottmüller.

Auch in den Arbeiten von Schottmüller-Bingold und Reiche werden diese Erreger als die zahlenmäßig am bedeutendsten hervorgehoben.

Diese Anaerobier kamen sowohl allein als auch gemeinsam mit aeroben Erregern vor.

Bacterium coli konnte in 9, Parakolibakterien in einem, Enterokokken in 5 Fällen nachgewiesen werden. 3 mal fanden sich außerdem aerobe Staphylokokken, 2 mal aerobe Streptokokken und in einem Fall haemolytische Streptokokken.

Unter den aeroben Erregern, die in den Blutkulturen gezüchtet werden konnten, steht das Bacterium coli zahlenmäßig im Vordergrund; es fand sich 9 mal in 20 Blutkulturen, d. h. in 45 % aller Fälle. Aber niemals wurde es in Reinkultur angetroffen, meist zusammen mit anaeroben Bakterien (8 mal, also in 89 %). 1 mal fand es sich in Gemeinschaft mit haemolytischen Streptokokken.

Auch diese Befunde bestätigen wieder die Tatsache, daß das Bacterium coli praktisch für sich allein keine Thrombophlebitis erzeugt, ebenso wenig wie es als Erreger der Endokarditis oder der lymphangitischen Sepsis in Betracht kommt.

Finden sich Colibakterien im Blut, so muß — wie auch aus Bingold's Schema ersichtlich — das Hauptaugenmerk der Niere, Gallenblase oder bei fieberhaftem Abort dem Uteruscavum zugewandt werden. Colibakterien verursachen zwar bekanntlich besonders hohe Fieberzacken und heftige Schüttelfröste, finden sie sich aber im Blute in Reinkultur, so ist die Erkrankung prognostisch nicht ungünstig zu bewerten, da es sich ja dann meist um therapeutisch leichter angreifbare Sepsisherde handelt.

Der Colibazillus läßt also praktisch das Venensystem unangetastet. Daher kommt eine Monoinfektion bei Thrombophlebitis kaum in Frage, er spielt höchstens als Begleitbakterium von Anaerobiern eine Rolle.

Diese Zusammenstellung zeigt also, daß auch in den oben angegebenen Fällen sich die verschiedenen Anaerobier als die exquisiten Erreger der Pylephlebitis erwiesen.

Ihre Bedeutung gerade bei der infektiösen Pfortaderphlebitis verdanken die Anaerobier neben der Tatsache, daß sie zu den ständigen Darmbewohnern gehören, auch ihrer ausgesprochenen invasiven Fähigkeit. Dank dieser Eigenschaft können sie sich nicht nur in vorgebildeten Thromben (z. B. nach Darmoperationen) ansiedeln und sich auf diesem Material besonders gut vermehren, sondern sie können zweifellos selbst zum mindesten zu einer Weiterverbreitung der Thrombophlebitis wesentlich beitragen.

II. Urfächliche Erkrankungen.

Aus der Tabelle ist zu ersehen, daß die Pylephlebitis 10 mal, d. h. in 50% der Fälle im Anschluß an eine Appendicitis auftrat. 4 mal wurde eine Haemorrhoidalveneninfektion festgestellt, 2 mal ein Rectumcarcinom, 1 mal ein Magencarcinom, in den übrigen Fällen ging eine Sigmoiditis, Cholecystitis bzw. ein Lungenabszeß voraus.

Nur wenige der vorausgegangenen Erkrankungen konnten in vivo einwandfrei eruiert und für die Pfortaderentzündung verantwortlich gemacht werden.

Die übrigen, für eine exakte Diagnosenstellung bedeutamen Faktoren traten leider nur zu oft in den Hintergrund.

Bezüglich der

III. Anamnese

muß gesagt werden, daß sie nur in wenigen Fällen eine einwandfreie Feststellung der Lokalisation der septischen Erkrankung ermöglichte.

Am ehesten lag noch bei Fall 17 (Pylephlebitis nach Haemorrhoidalveneninfektion) bereits nach Aufnahme der Anamnese der Verdacht auf Pylephlebitis nahe, obwohl die objektive klinische Untersuchung keinerlei sicheren Befund für einen intraabdominellen Infektionsherd ergab.

Es handelte sich um einen Patienten in mittlerem Lebensalter, der schon seit längerer Zeit an Haemorrhoiden litt, die mit einem sehr lästigen Ekzem verbunden waren. Der Patient war nicht sehr reinlich. Wegen des Juckreizes wurde häufig stark gerieben, so entstand eines Tages eine stärkere Blutung. Am nächsten Tage bekam der Patient auf dem Weg zur Arbeitsstätte plötzlich einen Schüttelfrost, sodaß er mit dem Krankenwagen nach Hause gefahren werden mußte. Er klagte über allgemeine Schmerzen in der rechten Bauchgegend. Der Blinddarm war schon früher entfernt worden.

Der Verdacht wurde bestätigt durch den Ausfall der Blutkultur, in der sich neben *Bacterium coli* zwei verschiedene Anaerobier fanden.

Doch unter Umständen kann die Anamnese eher irreführen, anstatt zur richtigen Diagnose zu verhelfen.

So war man z. B. im Fall 10 und 19 — bei denen anamnestisch eine Angina vorausgegangen war — geneigt, eine von den Tonsillen ausgehende Sepsis für die stürmischen Erscheinungen verantwortlich zu machen. Doch auch hier konnte wegen des Ausfalls der Blutkultur die Angina als ätiologisches Moment ausgeschaltet und per exclusionem die Diagnose auf Pylephlebitis gestellt werden.

In der weitaus größten Mehrzahl der Fälle war die Anamnese verschleiert und uncharakteristisch, teilweise ließ sie völlig in Stich. Oft verlief die Ursprungsinfektion völlig harmlos, nahezu symptomlos und vom Patienten kaum beachtet; ja, sie war sogar aus der Erinnerung des Patienten völlig verschwunden.

So konnte sich z. B. ein Patient (Fall 18) erst nach ganz genauem Befragen entsinnen, daß er 8 Tage vor dem jetzigen Krankheitsbeginn geringe Bauchschmerzen verspürt habe. Die eigentliche Krankheit aber sei über ihn wie ein Blitz aus heiterem Himmel hereingebrochen in Gestalt eines heftigen Schüttelfrostes. Danach fühlte er sich wohl müde und abgespannt, ging aber noch vier Tage seiner Arbeit nach, bis ihn 2 weitere heftige Schüttelfröste und Fieber über 40° ins Bett zwangen. Nun klagte Patient lediglich über starken Durst und Appetitlosigkeit, er mußte stark schwitzen, hatte etwas Auswurf und Erbrechen.

Auch bei Fall 16 trat urplötzlich ein Schüttelfrost auf, vorher bestanden außer einer geringen Müdigkeit keinerlei Krankheits-symptome, Schmerzen waren nicht vorhanden.

Ein 14-jähriges Mädchen (Fall 6) erkrankte ebenfalls plötzlich nachts mit Erbrechen und Leibschmerzen, bald danach stellten sich Durchfälle und ein Schüttelfrost ein.

Ähnlich lauten die Anamnesen fast sämtlicher Patienten. Auffallend war, daß besonders bei den Pylephlebitiden im Anschluß an Appendicitis die Vorgeschichte kaum auf eine Wurmfortsatz-erkrankung hinwies.

Auf die Tatsache, daß die Erscheinungen der Appendicitis

gelegentlich recht flüchtig oder laviert verlaufen, haben mehrere Autoren aufmerksam gemacht.

Schottmüller nahm besonders Stellung zu der Frage, unter welchen Umständen es zur Ausbildung einer Pylephlebitis nach Appendicitis kommt. Er konnte dabei häufig feststellen, daß die Appendix und der gebildete Abszeß hinter dem Coecum lag, also zwischen Darm und hinterer Beckenwand.

Es könnte also daran gedacht werden, daß gerade eine solche Verlagerung das Aufsteigen der Infektionserreger in die Venen des Mesenteriums, besonders der Vena ileocolica begünstigt.

Schottmüller sagt weiterhin: „Entwickelt sich die Entzündung hinter dem Typhlon, so wird das Peritoneum wenig oder gar nicht in Mitleidenchaft gezogen. Die peritonealen Reizerscheinungen sind aber dasjenige Moment, welches eine Appendicitis am meisten charakterisiert und am ehesten zu ihrer Erkennung führt“.

Diese These macht es verständlich, daß in solchen Fällen der appendicitische Anfall unter so geringfügigen Erscheinungen verläuft, sodaß er gelegentlich überhaupt nicht erkannt werden kann.

In den von uns beobachteten Fällen von Pylephlebitis nach Appendicitis konnte 4 mal teils durch die Palpation und Punktion, teils erst bei der Laparatomie oder Obduktion ein perityphlitischer Abszeß, teilweise mit retrocoecaler Verlagerung des Wurmfortsatzes, festgestellt werden.

Irgendwelche peritoneale Erscheinungen waren niemals zu konstatieren und konnten auch in keinem Fall anamnestisch eruiert werden.

So war also meist lediglich ein plötzlich auftretender Schüttelfrost das alarmierende und für den Patienten häufig das einzige Krankheitsymptom.

IV. Differentialdiagnose und klinische Verlaufsform.

Auch das klinische Bild ließ in keinem Fall die exakte Diagnose Pylephlebitis zu. Symptome, die auf das Bestehen eines intraabdominellen Prozesses hinwiesen, fehlten häufig völlig. Die Beschwerden der Patienten waren meist uncharakteristisch, nur in wenigen Fällen wurde über heftige, aber nur ungenau lokalisierbare Leibschmerzen geklagt.

Ein Blick in die Tabelle zeigt aber, daß fast alle Fälle mit — zum Teil sehr zahlreichen — Schüttelfrösten verliefen. Bei einem Fall (13) traten im Verlauf von 47 Krankheitstagen über 50 Schüttelfröste auf. Bei einigen Patienten wurde ein zum Teil tagelang fieberfreier Temperaturverlauf beobachtet, der immer wieder von Schüttelfrösten unterbrochen wurde. Verschiedentlich waren Schüttelfröste mehrmals täglich zu verzeichnen.

Dieses Symptom weist bekanntlich ganz besonders auf das Vorhandensein einer thrombophlebischen Sepsis hin; denn gerade für diese Sepsisform ist ein längerer Fieberverlauf mit hohen Zacken und zahlreichen Schüttelfrösten charakteristisch.

Da der Schüttelfrost durch eine Bakteriämie ausgelöst wird, entsteht er meist dann, wenn nur zu gewissen Zeiten Keime in die Blutbahn ausgeschwemmt werden. Eine periodenweise Keimausaat in das Blut findet besonders bei der thrombophlebischen Sepsis statt und daher ist bei dieser Erkrankung die sogenannte „septische Fieberkurve“ besonders deutlich ausgeprägt.

Doch auch bei der Sepsisform, die Bingold in seiner Rubrik „Eiterhöhlen unter Druck“ aufgeführt hat, können gehäufte Schüttelfröste auftreten, z. B. bei der Cholangitis septica. Bei der lymphangitischen Sepsis zeigt die Fieberkurve weniger Zacken.

Mitbestimmend für den Fieberverlauf ist auch stets die jeweilige Erregerart. Eine Dauerbakteriämie erzeugt im allgemeinen mehr eine Continua. Dieses Krankheitsbild charakterisiert vor allem die septische Endokarditis, ganz besonders, wenn sie durch Staphylokokken oder Streptokokken hervorgerufen wird. Natürlich gibt es auch hier wieder Ausnahmen. So zeichnet sich z. B. die Endokarditis durch Pneumokokken durch intermittierendes Fieber aus, während bei der Endokarditis durch anaerobe Streptokokken auch häufigere Schüttelfröste beobachtet wurden.

Aus dem Obengesagten geht hervor, daß auch der Fiebertyp nicht als unbedingtes Charakteristikum für eine bestimmte Sepsisform gelten kann.

Aber immerhin ergibt im allgemeinen schon die Betrachtung der Fieberkurve praktisch verwertbare, differentialdiagnostisch wichtige Hinweise.

Wir ziehen aus unseren Beobachtungen noch folgende Lehre:

Treten nach einer abdominellen Erkrankung, besonders nach einer Appendicitis, — und zwar auch nach einer erfolgreich operierten — ein oder mehrere Schüttelfröste auf, so muß erfah-

rungsgemäß an eine Fortleitung der Infektion auf das Venensystem der Pfortader gedacht werden. Nicht immer braucht allerdings die Infektion einen größeren Umfang anzunehmen.

Damit soll aber nicht gesagt sein, daß zu einem pylephlebitischen Krankheitsbild unbedingt ein Schüttelfrost gehört. Bingold weist ausdrücklich darauf hin, daß viele Bakteriämien ohne Schüttelfrost verlaufen.

Bei einem jungen Patienten (Fall 19), der plötzlich von außerordentlich heftigen Leibschmerzen befallen wurde, waren z. B. keine Schüttelfröste vorhanden und doch wuchsen in der während hohen Fiebers angelegten Blutkultur anaerobe Streptokokken und Kolibakterien.

In diesem, wie auch noch in einigen anderen Fällen war der Temperaturverlauf und das gesamte klinische Bild auch durch metastatische Herde beeinflusst.

Die genaue Untersuchung des oben erwähnten Falles ergab über den untersten Partien der rechten Lunge ein feines Reibegeräusch, sodaß die erste Diagnose Pleuritis diaphragmatica lautete. Doch wegen des Vorhandenseins von Darmbakterien neben Anaerobiern in der Blutkultur wurde per exclusionem ein Sepsisherd im Pfortadergebiet diagnostiziert, obwohl anamnestisch eine Angina vorausgegangen war.

Der Infiltrationsherd über den rechten unteren Lungenpartien breitete sich immer mehr aus; eine hochgradige Herzschwäche machte einen operativen Eingriff unmöglich.

Bei der Obduktion wurde die Diagnose bestätigt; es fand sich 2½ handbreit über dem Sphincter ani eine handflächengroße ulceröse Schleimhautaffektion, die in vivo unmöglich diagnostizierbar war. Von hier aus war die septische Infektion auf dem Venenweg weitergeschritten. Der Lungenherd war embolisch entstanden. Die heftigen Leibschmerzen wurden reflektorisch auf dem Wege über die Pleuritis diaphragmatica ausgelöst.

Die übrigen 19 Fälle blieben frei von Lungenmetastasen.

Bekanntlich zeichnet sich die pylephlebitische Sepsis überhaupt durch Metastasenarmut aus. Da größere Thrombenteilchen meist schon in den Pfortaderästen (besonders in der Leber) stecken bleiben, ist diese Armut an Tochterherden trotz der zahlreichen Bakteriämien leicht erklärlich, vor allem auch in den

Lungen. Fehlen daher Lungenherde, so kann das unter Umständen die Diagnose auf Pylephlebitis eher noch stützen.

Bei den übrigen thrombophlebitischen Sepsisformen finden sich dagegen weitaus häufiger Metastasen in der Lunge. Im übrigen Körper ist auch hier im Vergleich zu den anderen Sepsishaupttypen die Metastasenbildung nur gering.

Naturgemäß werden ja bei einem in den übrigen Körpervenen gelegenen Sepsisherd die Emboli vorwiegend in den Lungen abgefangen. Die Eigenart der sich aus den Lungenmetastasen entwickelnden Krankheitsercheinungen lassen manchmal wichtige Rückschlüsse zu auf die Erregerart und damit wieder auf den Sitz der Primärinfektion, eben auf den Sepsisherd.

Aerobier führen mit Ausnahme des *Streptococcus viridans* zu Lungenabszessen und Anaerobier zu gangränescierenden foetiden Herden. So kann gelegentlich schon durch foetides Sputum im Verlauf einer unklaren fieberhaften Erkrankung der Verdacht auf eine Thrombophlebitis im uterinen, tonsillären oder otogenen und in seltenen Fällen auch im Pfortader-Gebiet auftauchen.

Bekanntlich unterscheiden sich die Anaerobier von den allgemein anerkannten Eitererregern auch dadurch, daß sie weniger häufig als die Aerobier Metastasen verursachen. Diese Erfahrungstatsache kann als weiterer Grund gelten für die Metastasenarmut der thrombophlebitischen Sepsisformen. Bei den verhältnismäßig seltenen Thrombophlebitiden durch aerobe Streptokokken und Staphylokokken wurden im Laufe der Zeit wesentlich mehr Metastasen beobachtet als bei der Veneninfektion durch anaerobe Erreger.

Bei der pylephlebitischen Sepsisform finden sich dagegen gar nicht so selten Metastasen in der Leber, und zwar meist in Form von jauchigen Abszessen.

Wie aus der Tabelle ersichtlich, konnten unter unserem klinischen Material 5 mal Leberabszesse, teils durch Palpation und Punktion, teils erst bei der Laparatomie und Obduktion diagnostiziert werden. Eine wesentliche Beeinträchtigung des Krankheitsverlaufes durch die Lebermetastasen konnte in keinem Fall festgestellt werden.

Das Blutbild ergab bei allen 5 Patienten eine beträchtliche Zunahme der Leukozyten (bis zu 35.000). Nach den Erfahrungen Bingolds sollen die höchsten Leukozytenwerte durch Leberabszesse bewirkt werden, Schottmüller fand in solchen Fällen bis zu 70.000 Leukozyten.

Eine hohe Leukozytose bei einer septischen Erkrankung kann somit den Verdacht auf metastatische Leberabszesse nahelegen.

An den Weichteilen, die einem besonderen Druck oder einer sonstigen Schädigung ausgesetzt waren, kam es bei 3 Patienten zu verjauchenden metastatischen Herden.

In allen 3 Fällen handelte es sich um Infektionen mit anaeroben Streptokokken, 2 mal wurden sie in Gemeinschaft mit Gasbazillen angetroffen. Bekanntlich siedeln gerade anaerobe Erreger mit Vorliebe an geschädigten Stellen oder totem Gewebe an. (Fall 8, 18, 20.)

An der übrigen Haut waren in keinem Falle besondere Veränderungen zu konstatieren. Schottmüller hat bei Pylephlebitis merkwürdige Hautnekrosen beobachtet. Gelegentlich sollen dem Erythema exsudativum multiforme ähnelnde Effloreszenzen vorkommen. Aber diese Hauterscheinungen sind keinesfalls typisch für die pylephlebitische Sepsis.

Die übrigen klinischen Symptome waren für die Differentialdiagnose gegenüber den anderen Sepsisformen wenig aufschlußreich.

Die geklagten allgemeinen Beschwerden und klinischen objektiven Symptome waren fast durchwegs uncharakteristisch und verworren.

Natürlich konnten auch bei diesen septischen Erkrankungen ikterische Verfärbungen der Haut, cerebrale Störungen wie Benommenheit, Bewußtlosigkeit, Verwirrtheit, Krämpfe, Vasomotorenschwäche, polyarticuläre Schwellungen und verschiedene andere Sepsissymptome beobachtet werden.

Blutbild, Bilirubin Spiegel, Stuhl- und Urinkulturen wiesen wohl bei der Gesamtbeurteilung in den meisten Fällen auf eine septische Erkrankung hin, für eine exakte Diagnose, d. h. für eine genaue Lokalisationsbestimmung des Sepsisherdes aber waren diese diagnostischen Hilfsmittel allein nicht verwertbar.

V. Therapie und Ausgang.

Nur die genaue Kenntnis des Krankheitsbildes und eine frühzeitige Diagnose wird die Möglichkeit geben, daß man in einem, wenn auch spärlichen Prozentsatz der Fälle durch die operative Inangriffnahme des Sepsisherdes eine Rettung bringen kann.

Da bei jeder septischen Erkrankung die Prognose in erster Linie von der Lokalisation des Sepsisherdes abhängig ist, hat sie naturgemäß wegen der an sich schwer zugängigen Lage des pylephlebitischen Krankheitsherdes als besonders infaust zu gelten.

Von all den zahllosen Mitteln, die zur internen Sepsistherapie angepriesen werden, konnte nie ein Erfolg beobachtet werden.

Entsprechend der Bedeutung, die dem Sepsisherd zukommt, gibt es nur eine einzige sichere Therapie und das ist die chirurgische, die Unterbindung der befallenen Pfortaderäste.

Bereits im Jahre 1910 haben sich Braun und nach ihm Wilms, Ohlecker usw. für die Operation eingesetzt. Brütt hat 3 mal unter seinen Fällen von Pylephlebitis nach Appendicitis eine Ligatur der Vena ileocolica vorgenommen. Davon wurde nur ein Fall geheilt. Trotzdem empfiehlt auch er bei der nahezu stets letalen Prognose der ausgeprägten Pylephlebitis nach Appendicitis für klinisch sichere Fälle die Ligatur der Vena ileocolica bezw. der Vena mesenterica superior. Brütt warnt vor einem zu langen Warten vor dem Eingriff.

Auch der Amerikaner Ralph Colp tritt für eine Unterbindung und eine Excision der thrombophlebitischen Venen ein. Er hat sogar die Unterbindung der Pfortader selbst vorgenommen. Daß dieser Eingriff mit dem Leben verträglich ist, beweisen einzelne Literaturangaben.

Nach Ausschaltung der Vena porta entsteht ein Kollateralkreislauf über die hepatopetalen Venen im Ligamentum hepatogastricum. Diese müssen bei der Freilegung der Pfortader sorgfältig geschont werden.

Bei den 4 Fällen, bei denen Colp die Pfortader unterbunden hat, trat kein Ascites und keine Venenstauung in der Bauchhöhle auf. Allerdings sind auch diese Fälle ad exitum gekommen.

Es muß hier auch auf einen Fall verwiesen werden, der von Blank und Remmetz (Dortmund) mitgeteilt wurde. Auch hier wurde die Pfortaderunterbündung im Stamme selbst vorgenommen. Danach hörten die Schüttelfröste sofort auf und es kam zu einer Besserung des Allgemeinzustandes. Die Pfortaderausschaltung führte auch nicht zu Ascitis oder zu Venenstauung. Auch später traten keinerlei Störungen auf.

William Thalhimer, der in einer amerikanischen Zeitschrift eine größere Abhandlung über die Pfortaderentzündung veröffentlicht hat, tritt dafür ein, daß der Schüttelfrost eine unbedingte Indikation zur Operation ist, selbst dann, wenn sie aus anderen Gründen nicht dringend erscheint. Bei 4 Fällen von akuter Appendicitis mit Schüttelfrösten zeigten bei den nachträglichen mikroskopischen Untersuchungen sämtliche Venen im Mesenterium kokkenhaltige, zum Teil eitrige Thromben. Die Vena ileocolica und die anderen Venen waren noch frei von Thromben. 3 Patienten wurden durch die Frühoperation geheilt. Der 4., bei dem der gleiche histologische Befund erhoben wurde und bei dem man nachträglich eine Unterbindung vornehmen wollte, verweigerte die Operation und kam an fortschreitender Pylephlebitis ad exitum.

Überblicken wir nun unsere Krankheitsfälle, so sehen wir, daß die Indikation zur Operation leider sehr selten gestellt werden konnte.

Entweder war der Zustand, in dem die Patienten eingeliefert wurden, oder in dem sie in der Konsiliarpraxis zur Untersuchung gelangten, schon dermaßen schlecht, daß man sich von vorneherein von einer Operation keinen Erfolg mehr versprechen konnte.

So wurde z. B. Fall 1, der 20 Tage lang mit häufigen Schüttelfrösten zu Hause im Bett lag, erst 3 Tage vor dem Exitus in äußerst elendem Zustand eingeliefert, der eine Operation unter allen Umständen ausschloß.

Als weiteres Beispiel sei Fall 8 angeführt, bei dem der Exitus bereits 2 Tage nach der Krankenhausaufnahme eintrat. Schüttelfröste waren zu Hause vermutlich vorausgegangen, konnten aber in der Klinik nicht beobachtet werden.

Fall 15 wurde 12 Tage nach der Aufnahme mit der Dia-

gnose Pylephlebitis auf die chirurgische Abteilung verlegt. Die Prognose war von vorneherein sehr schlecht, da bereits gehäufte Schüttelfröste vorausgegangen waren. Wegen des Palpationsbefundes und der Leukozytose wurden ein oder multiple Leberabszesse vermutet. Eine Operation wurde nicht vorgenommen. 7 Tage nach der Verlegung erfolgt der Exitus letalis.

Die Sektion brachte die Bestätigung der Diagnose: perforierte Appendicitis mit umschriebener Abszeßbildung. Thrombose der Pfortaderäste bis an den Leberhilus hinauf. Multiple Leberabszesse.

In den unten angeführten Fällen konnte sich der hinzugezogene Chirurg wegen der Geringfügigkeit der klinischen Symptome, die keinen sicheren Anhaltspunkt für einen intraabdominellen Infektionsherd ergaben, zu keinem chirurgischen Eingriff entschließen.

Besonders eindrucksvoll ist in dieser Beziehung das Schicksal eines Patienten (Nr. 16), dessen Krankengeschichte hier wiedergegeben werden soll:

Anamnese: Der 63 jährige Mann fühlte sich unvermittelt müde und matt, hatte aber keinerlei Schmerzen. Am nächsten Tag bekam er einen Schüttelfrost. Der zugezogene Arzt stellte zunächst die Diagnose auf Grippe: 2 Tage später aber äußerte er den Verdacht auf eine Blinddarmentzündung und zog einen Chirurgen hinzu, der sich aber hinsichtlich einer Operation abwartend verhielt. In den nächsten Tagen gingen die Temperaturen abendlich wieder hoch und es stellten sich auch Schüttelfröste ein; dann stieg die Temperatur 10 Tage nach Beginn der Erkrankung auf 40°. Der erneut hinzugezogene Chirurg stellte Eiter in der Bauchhöhle fest und riet anscheinend auch zur Operation. Es traten immer wieder Schüttelfröste auf, bis zu 6 mal täglich. Stuhl war angehalten. Hohe Temperaturen bis zu 40,6°, sehr schlechtes Allgemeinbefinden, häufige Brechreiz.

Der Arzt konnte draußen einen appendicitären Tumor feststellen.

17 Tage nach Beginn der Erkrankung erfolgt nach nochmaliger Hinzuziehung eines Facharztes die Einweisung ins Krankenhaus.

Status: Der Patient befindet sich in recht mäßigem Ernährungs- und Kräftezustand, macht einen schwerkranken Eindruck. Haut und Skleren ikterisch.

Über der ganzen Lunge etwas rauhes Atmen mit vereinzelt bronchitischen Nebengeräuschen und rechts hinten unten wenige, nicht konstante Rasselgeräusche.

Herz: Töne leise, anscheinend rein, vereinzelt Extrasystolen.

Abdomen: Ziemlich meteoristisch aufgetrieben. Leber eben tastbar. Nieren- und Milz frei. Es besteht eine Druckempfindlichkeit im Unterbauch beiderseits, rechts etwas stärker als links. Die Druckempfindlichkeit nimmt in der Ileocoecalgegend etwas zu.

Im rechten Oberbauch und Magengegend ebenfalls geringe Druckempfindlichkeit. Ein Tumor läßt sich nicht tasten. Rektalbefund: o. B.

Verlauf: In einem sofort einberufenen Konsilium wird vom Chirurgen erklärt, daß zur Zeit ein operativer Eingriff nicht in Frage komme.

Am Abend des Einlieferungstages bekommt Patient leichtes Frieren, die Temperatur steigt etwas an: Anlage einer Blutkultur. Zu einigen ausgeprägten Schüttelfrösten kommt es im Laufe des nächsten Tages. Ansteigen der Leukozyten auf 35.000, leichte Zunahme der Gelbfärbung. In den nächsten Tagen immer wieder Schüttelfröste (durchschnittlich 1—2 mal täglich). Recht mäßiger Allgemeinzustand. Ein sicherer Tastbefund im Leib ist nicht zu erheben. Es besteht eine etwas vermehrte Druckempfindlichkeit in der Ileocoecalgegend. Am Herzen ist zeitweise eine systolische Unreinheit oder systolisches Geräusch zu hören.

6 Tage nach der Aufnahme erklärt sich der Chirurg in einem neuen Konsilium zu einem operativen Eingriff bereit. Am 7. Tage folgen 3 weitere Schüttelfröste, gegen Abend ein äußerst heftiger mit fast 41° Temperatur. Es erfolgt Verlegung auf die chirurgische Station mit der Diagnose: Pylephlebitis im Pfortaderkreislauf, ausgehend wohl von der Appendix.

Operationsbefund: Eröffnung einer faußgroßen Abzeföhöhle an der hinteren Bauchwand. Abzeß geht sicher vom Wurm aus. Appendix wird nicht aufgesucht.

Die chirurgische Diagnose lautete: Anaerobiersepsis, ausgehend von perityphlitischem Abzeß.

Auch in diesem Falle bestätigte der klinische Verlauf und der Operationsbefund die lediglich per exclusionem aus der Blutkultur gestellte Diagnose.

Bei einem weiteren Fall (Nr. 13), einem 14 jährigen Mädchen, erfolgte die Einweisung ins Krankenhaus 9 Tage nach dem ersten Schüttelfrost mit der Diagnose: Typhus-Verdacht.

Bei der Aufnahme war weder am Herzen noch an der Lunge ein pathologischer Befund zu erheben. Ausdrücklich sei erwähnt, daß weder Milz noch Leber vergrößert, daß der Leib vollkommen weich war und weder Druckempfindlichkeit noch Spannung aufwies.

Im Vordergrund des Krankheitsbildes standen zahlreiche Schüttelfröste, die sich Tag für Tag bis zu 4 mal pro die wiederholten. Ein Abtasten des Körpers nach einem Sepsisherd verlief ergebnislos. Auf Grund des bakteriologischen Befundes der Blutkultur (anaerobe Streptokokken, Gasbazillen und Bac. symbiophilus Schottmüller) wurde ebenfalls per exclusionem die Diagnose auf Pylephlebitis nach Appendicitis gestellt. Der Vollständigkeit halber sei hier nochmals erwähnt, daß 2 vorher angelegte Blutkulturen steril geblieben waren. Sämtliche Untersuchungen auf Typhus waren negativ verlaufen.

Bei einer genauesten, erneuten Erhebung der Anamnese durch die Mutter stellte sich heraus, daß gleich zu Beginn der Erkrankung Erscheinungen vorhanden waren, die man vielleicht mit dem Wurm in Verbindung hätte bringen können. Auch der behandelnde Arzt — nach den Aussagen der Mutter zu schließen — hat sicher genau auf Appendicitis

untersucht, konnte aber diese Diagnose wegen des negativen Befundes und der Schüttelfröste nicht mehr aufrechterhalten.

Wegen des Mangels einwandfreier Symptome konnte sich der Chirurg vorerst nicht zu einer von interner Seite vorgeschlagenen Unterbindung der Vena ileocolica entschließen. Da die Schüttelfröste aber anhielten und alle internen Mittel versagten, erfolgte am 8. Tage nach der Einlieferung, also 17 Tage nach dem 1. Schüttelfrost, der chirurgische Eingriff, der die klinische Diagnose bestätigte.

Bei der Operation zeigte sich einwandfrei eine abgelaufene Appendicitis. Der Wurm war noch geschwollen, nach hinten verlagert und verklebt. Höher oben quoll bei vorsichtigem Absuchen des Pfortadersystems flinkender Eiter hervor. Der Zusammenhang mit einem Gefäß war deutlich sichtbar. Die bakteriologische Untersuchung des perityphlitischen Abszesses ergab den gleichen Befund wie die der Blutkultur.

Den tragischen Ausgang teilt dieser Fall leider noch mit verschiedenen anderen.

Die Operation kam zu spät!

Die Thrombophlebitis war bereits zu weit fortgeschritten und wegen technischer Schwierigkeiten wurde eine Unterbindung weit oben im Pfortadersystem nicht vorgenommen.

In dem oben erwähnten Fall (Nr. 13) konnte leider der putride Infektionsherd nur drainiert werden. Die Schüttelfröste kamen immer wieder, eine Zeitlang trat eine Continua ein, dann erneute Schüttelfröste und 29 Tage post operationem erfolgte der Exitus letalis.

Bei der Sektion zeigte es sich, daß die Thrombophlebitis auf große Bezirke der Pfortaderäste und retrograd bis in die Milzvenen hinein fortgeschritten war.

Im Fall 16 blieb der chirurgische Eingriff auf eine Eröffnung und Drainage des vorhandenen Abszesses beschränkt, der thrombophlebitische Herd selber wurde nicht ausgeschaltet.

Bei Fall 7 und 9 wanderte — wie aus dem Sektionsprotokoll ersichtlich — die Pylephlebitis oberhalb der Unterbindungsstelle weiter.

Im Fall 4 durfte man sich von vorneherein von einer Operation keinen unbedingten Erfolg versprechen, da nach längerer Beobachtung ein Neoplasma als Primärsitz der Infektion angenommen werden mußte.

Die Blutkulturen konnten ebenfalls meist erst dann angelegt werden, wenn schon zahlreiche Schüttelfröste vorausgegangen waren.

Die dadurch bedingte Verzögerung in der Festlegung der Diagnose ließ eine Operation ohne weiteres als wenig erfolgreich erscheinen. Als weiteres hemmendes Moment kam noch der in diesen Fällen sehr elende, wenn nicht sogar moribunde Zustand der betreffenden Patienten hinzu.

In den Fällen 3 und 12 konnte eine selten vorkommende

Spontanheilung beobachtet werden. Der Temperaturverlauf wurde plötzlich normal, die Schüttelfröste blieben aus, der Allgemeinzustand besserte sich allmählich und die Patienten konnten geheilt entlassen werden.

Die frühzeitig mögliche Diagnose und sofort vorgenommene Unterbindung der Vena ileocolica führte im Fall 14 zur Heilung einer Pylephlebitis.

Bei dem hochfiebernden Patienten waren vor der Aufnahme ins Krankenhaus erst zwei Schüttelfröste vorausgegangen. Seit 6 Tagen bestand Fieber und zeitweise Schmerzen im linken Unterbauch. 2 Monate vor der Einlieferung fühlte sich Patient schon einmal sehr matt und hatte unsicher zu wertende Verdauungsbeschwerden. Der Arzt konstatierte wegen Leberschwellung eine beginnende Cirrhose.

Bei der Aufnahme bestand ein leichter Subikterus und geringer Meteorismus des Abdomens. Leber und Milz waren nicht zu tasten. Unterhalb des linken Rippenbogens glaubt die palpierende Hand eine tumorartige Resistenz zu tasten.

Am gleichen Abend traten 40° Fieber auf, während des Schüttelfrostes wird eine Blutkultur angelegt. Wegen des Nachweises von Darmbakterien in der Blutkultur erfolgt Verlegung auf die chirurgische Abteilung mit der Diagnose Pylephlebitis nach Appendicitis.

Bei der Laparotomie fand sich im Douglas fibrinöses Exsudat und eine entzündliche Veränderung des perityphlitischen Gewebes. Es wird eine Unterbindung der Vena colica dextra vorgenommen.

Von diesem Moment an schlagartige Änderung im Befinden des Patienten. Die Temperaturen blieben nun unten, die Blutkulturen steril, der Patient konnte nach 14 Tagen geheilt entlassen werden.

Auf die nahezu unentbehrliche diagnostische Bedeutung der Blutkulturresultate wurde bereits hingewiesen. Und doch muß ein frühzeitiger chirurgischer Eingriff auch dann vorgenommen werden, wenn auch die Blutkultur negativ ausfällt, sofern aber nach sicher vorher festgestellten Darminfektionen Schüttelfröste auftreten. Denn auch unsere Fälle haben wieder bewiesen, daß eine Operation — als die einzige kausale Therapie — nur dann erfolgreich sein kann, wenn sie frühzeitig und ausgiebig vorgenommen werden kann.

Die Frühoperation aber steht und fällt naturgemäß mit der Frühdiagnose.

Schlußbetrachtung:

Wert der bakteriologischen Blutkultur.

Aus diesen Ausführungen geht hervor, daß bei den weitaus meisten Patienten auch eine sorgfältig und zielbewußt aufge-

nommene Anamnese, eine gewissenhafte Untersuchung des Patienten und genaue Beobachtung der Symptome und des klinischen Verlaufes nicht zur völligen Klärung, d. h. zur genauen Lokalisationsbestimmung des Sepsisherdes führte.

Von souveräner und ausschlaggebender Bedeutung erwies sich immer wieder die Deutung der bakteriologischen Blutkultur.

Das Vorhandensein bestimmter Keime im Blut läßt das eine Mal manchen Sepsisherd ausschließen und weist das andere Mal auf einen bestimmten Sepsisherd hin.

Die Betrachtung des Bingold'schen Schemas auf Seite 10 läßt erkennen, daß z. B. Staphylokokken so gut wie nie zu einer lymphangitischen Sepsis führen. Der Nachweis dieses Erregers kann also unter Umständen schon diese Diagnose ausschließen.

Die Anaerobier sind neben den Staphylokokken die Haupterreger der thrombophlebitischen Sepsis. Wir sehen: hier kann die Infektion von der Uterushöhle, von einer Angina oder von einem infektiösen Darmprozeß ausgegangen sein. Scheiden anamnestisch und auf Grund des kontrollierbaren Lokalbefundes die zwei ersten Eintrittspforten aus, so wird sich der Verdacht nach einer Pylephlebitis hin verdichten, auch wenn die vorausgegangene Appendicitis z. B. laviert verlaufen war.

Doch selbst bei den Pylephlebitisfällen Nr. 10 und 19, bei denen anamnestisch eine Angina vorausgegangen war und die klinischen Symptome nicht auf einen intraabdominalen Infektionsherd hinwiesen, konnte die Blutkultur, in der sich neben anderen — auch anaeroben — Erregern beidemale *Bacterium coli* fand, zur richtigen, durch die Obduktion bestätigten Diagnose führen.

Weiter haben wir gesehen, daß Colibakterien so gut wie nie zu einer Veneninfektion führen, dagegen sind sie die Haupterreger der nephrogenen und cholangitischen Sepsis.

Gasbazillen im Blute weisen fast immer auf eine uterine Infektion hin, denn bei Gasbrand und malignem Ödem sind wegen der charakteristischen Erscheinungen kaum differentialdiagnostische Schwierigkeiten möglich.

Diese wenigen Beispiele sollen zeigen, daß die Deutung der Blutkulturen — besonders in gemeinsamer Würdigung mit der

Vorgeschichte und der klinischen Symptome — fast immer zur richtigen Diagnose des Sepsisherdes führt.

Die Bedeutung der Blutkulturresultate, vor allem der Nachweis von Anaerobiern, liegt insbesondere darin, daß man auch bei den Fällen, wo der Ausgangspunkt der Sepsis nicht festzustellen war, diagnostisch in erster Linie auf das Pfortadergebiet hingewiesen wird.

Wegen genauer Beachtung dieser Verhältnisse wurde bei keinem der oben angeführten Fälle, über die in dieser Arbeit näher berichtet wurde, die Diagnose auf fortgeleitete Thrombophlebitis im Pfortadergebiet bei der Laparatomie oder Obduktion für falsch befunden.

Herrn Professor Dr. Bingold möchte ich auch an dieser Stelle für die Überlassung des Themas und die lebenswürdige Unterstützung bei der Anfertigung der Dissertation meinen herzlichsten Dank aussprechen.

Auch Herrn Geheimrat Professor Dr. Jamin bin ich für die Übernahme des Referats zu Dank verpflichtet.

Literaturverzeichnis:

- Bingold: Septische Erkrankungen. Neue Deutsche Klinik Band IX. 1932.
Besteht die Möglichkeit, schon intravital die Lage des Sepsisherdes festzustellen? Medizin. Klin. 1933. Nr. 16.
Die Klinik und Ätiologie der infektiösen Pfortadererkrankungen. Die medizinische Welt 1931, Nr. 47/49.
Die klinischen Formen der Gasbazilleninfektion. Deutsche Medizinische Wochschr. 1935. Nr. 43, 44, 45 und 47.
- Brütt: Zentralblatt für Chirurgie 1922.
- Colp, Ralph: Referat. Zentralblatt f. d. ges. Chir. 37, 1927.
- Dietrich: Thrombose, ihre Grundlage und ihre Bedeutung. Springer-Berlin 1932.
- Finkelstein: Die Krankheiten der Verdauungsorgane. Aus Fehr: Lehrbuch der Kinderheilkunde. Fischer-Jena 1930.
- Kleinschmidt: Studien über die Anaerobier des Säuglingsdarms. Jahrbuch für Kinderheilkunde. Bd. CX 1925. Karger-Berlin.
- Küster: Normale Bakterienflora in Mund, Nasenhöhle und Vagina bei Mensch und Tier. Aus Kolle, Kraus, Uhlenhuth. Handbuch der pathogenen Mikroorganismen. Band IV 1. Fischer-Urban und Schwarzenberg. 1929.
- Nissle: 1. Die normalen Darmbakterien und ihre Bedeutung für den Organismus. Aus Kolle, Kraus, Uhlenhuth. Handbuch der pathogenen Mikroorganismen. Band IV 1. Fischer-Urban und Schwarzenberg 1929.
2. Die Colibakterien und ihre pathogene Bedeutung. Aus Kolle, Kraus, Uhlenhuth. Handbuch der pathogenen Mikroorganismen. Band IV 1. Fischer-Urban und Schwarzenberg 1929.
- Schottmüller-Bingold: Die septischen Erkrankungen. Handbuch der inneren Medizin 1925.
- Thalhimer: Archiv of surg. Band VIII, Nr. 2; 1924.

Inhaltsverzeichnis.

	Seite
I. Allgemeiner Teil:	
Einleitung	5
Entstehung einer Thrombose	5
Ursachen einer Thrombose	6
Die infektiöse Thrombophlebitis	7
Der Begriff der Sepsis	8
Die thrombophlebitische Sepsis im Rahmen der septischen Erkrankungen	8
Die Pylephlebitis im Rahmen der thrombophlebitischen Sepsisformen	10
Die Blutkultur, ihre Anlage und Verarbeitung	12
Die Bakterienflora am Ort der Infektion	16
Pathogenese der Pylephlebitis	20
Arten der Primärinfektion	21
II. Spezieller Teil:	
Übersicht der an der Nürnberger Klinik beobachteten Pylephlebitisfälle	25
Ergebnisse der bakteriologischen Blutkultur	31
Ursächliche Erkrankungen	33
Anamnese	33
Differentialdiagnose und klinische Verlaufsform	35
Therapie und Ausgang	40
Wert der bakteriologischen Blutkultur	45

Lebenslauf.

Am 7. Oktober 1910 wurde ich als Tochter des Oberingenieurs Adolf Meder und seiner Ehefrau Mary, geb. Schramm zu Nürnberg geboren. Nach dem Besuch des Mädchenlyzeums und Realgymnasiums Nürnberg, erhielt ich am 10. April 1930 das Reisezeugnis dieser Anstalt. Im Sommersemester 1930 immatrikulierte ich mich an der Universität Erlangen als Studierende der Medizin. Nach einem 5 semestrigen Studium an dieser Universität und der Universität Königsberg legte ich im Sommersemester 1932 in Erlangen die ärztliche Vorprüfung ab; nach weiteren 6 Studiensemestern an den Universitäten Erlangen, Graz und Berlin bestand ich in Erlangen 1935 das medizinische Staatsexamen.

Die Ableistung des praktischen Jahres erfolgte an der I. medizinischen Klinik und der Hautklinik des Städt. Krankenhauses in Nürnberg.

Edeltraut Meder.

